



**HAL**  
open science

## Formulaire de Probabilités et Statistique

Christophe Chesneau

► **To cite this version:**

Christophe Chesneau. Formulaire de Probabilités et Statistique. Licence. France. 2016. cel-01260327v7

**HAL Id: cel-01260327**

**<https://cel.hal.science/cel-01260327v7>**

Submitted on 21 Feb 2017 (v7), last revised 9 May 2017 (v8)

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.


L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Formulaire de Probabilités et Statistique

---

Christophe Chesneau

<http://www.math.unicaen.fr/~chesneau/>





## Table des matières

1	Dénombrement	5
2	Calculs utiles	9
3	Espaces probabilisés et probabilités	11
4	Probabilités conditionnelles et indépendance	15
5	Variables aléatoires réelles ( <i>var</i> ) discrètes	18
6	Lois discrètes usuelles	22
7	Modélisation	25
8	Couples de <i>var</i> discrètes	27
9	Vecteurs de <i>var</i> discrètes	32
10	Convergences de suites de <i>var</i> discrètes	35
11	Calcul intégral	36
12	Variables aléatoires réelles à densité	40
13	Lois à densité usuelles	45
14	Retour sur la loi normale	49
15	Couples de <i>var</i> à densité	52
16	Vecteurs de <i>var</i> à densité	59
17	Convergences de suites de <i>var</i> ; généralité	64
18	Introduction à l'estimation paramétrique	66

<b>19 Intervalles de confiance</b>	<b>68</b>
<b>20 Tests de conformité</b>	<b>69</b>

~ **Note** ~

Ce document présente les principales formules brutes abordées dans le cours *Probabilités et Statistique* du L3 de l'université de Caen. Notes importantes :

- On suppose acquis les concepts de base sur les ensembles. Par exemple, voir :

<http://www.math.unicaen.fr/~chesneau/notions-de-base.pdf>

- Des points techniques ont volontairement été omis ;  $f, g, h, g_i$  désignent des fonctions sur  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{R}^2$  ... ou  $\mathbb{R}^n$  selon le contexte ; **lorsqu'une quantité est introduite (dérivé, somme, intégrale, espérance, variance ...), il est supposé que celle-ci existe.**

Je vous invite à me contacter pour tout commentaire :

[christophe.chesneau@gmail.com](mailto:christophe.chesneau@gmail.com)

Quelques ressources en lien avec ce cours :

- Probabilités de Stéphane Ducay :

<http://www.lamfa.u-picardie.fr/ducay/Accueil.html>

- Introduction aux Probabilités de Arnaud Guyader :

<http://www.lsta.lab.upmc.fr/modules/resources/download/labsta/Pages/Guyader/IntroProba.pdf>

- Éléments de cours de Probabilités de Jean-François Marckert :

[http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours/La\\_regression\\_dans\\_la\\_pratique.pdf](http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours/La_regression_dans_la_pratique.pdf)

- Probabilités et Statistiques de Alain Yger :

<https://www.math.u-bordeaux.fr/~ayger/Proba6031.pdf>

- Cours de Théorie des probabilités de Bruno Saussereau :

<http://bsauss.perso.math.cnrs.fr/CTU-1314-SAUSSEREAU-THEORIE-DES-PROBABILITES.pdf>

Bonne lecture !

# 1 Dénombrement

## Vocabulaires :

Notations	Vocabulaire	Notations	Vocabulaire
$\emptyset$	ensemble vide	$A \cup B$	réunion de $A$ et $B$
$\Omega$	ensemble plein	$A \cap B$	intersection de $A$ et $B$
$\{\omega\}$	singleton de $\Omega$	$A - B$	intersection de $A$ et $\bar{B}$
$A$	partie de $\Omega$	$A \cap B = \emptyset$	$A$ et $B$ sont disjoints
$\omega \in A$	$\omega$ appartient à $A$	$A \subseteq B$	$A$ est inclus dans $B$
$\bar{A}$	complémentaire de $A$ dans $\Omega$	$A \times B$	produit cartésien de $A$ et $B$

## Exemple :

Ensemble	Définition	$A = \{a, b\}, B = \{b, c\}, \Omega = \{a, b, c\}$
$\bar{A}$	$\{x \in \Omega; x \notin A\}$	$\{c\}$
$A \cup B$	$\{x \in \Omega; x \in A \text{ ou } x \in B\}$	$\{a, b, c\}$
$A \cap B$	$\{x \in \Omega; x \in A \text{ et } x \in B\}$	$\{b\}$
$A - B$	$\{x \in \Omega; x \in A \text{ et } x \notin B\}$	$\{a\}$
$A \times B$	$\{(x, y); x \in A \text{ et } y \in B\}$	$\{(a, b), (a, c), (b, b), (b, c)\}$

## Opérations :

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C),$$

$$\left( \bigcup_{k=1}^n A_k \right) \cap B = \bigcup_{k=1}^n (A_k \cap B), \quad \left( \bigcap_{k=1}^n A_k \right) \cup B = \bigcap_{k=1}^n (A_k \cup B).$$

**Lois de Morgan :**

$$\begin{aligned}\overline{A \cup B} &= \overline{A} \cap \overline{B}, & \overline{A \cap B} &= \overline{A} \cup \overline{B}, \\ \overline{\bigcup_{k=1}^n A_k} &= \bigcap_{k=1}^n \overline{A_k}, & \overline{\bigcap_{k=1}^n A_k} &= \bigcup_{k=1}^n \overline{A_k}.\end{aligned}$$

**Partition :**  $(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  partition de  $\Omega \Leftrightarrow (A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  disjoints deux à deux et  $\bigcup_{k=1}^n A_k = \Omega$ .

**Cardinal :** Le nombre des éléments d'un ensemble fini  $A$  est appelé cardinal de  $A$ . Il est noté  $\text{Card}(A)$ .

**Formule du crible (à l'ordre 2) :**

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

**Formule du crible (à l'ordre  $n$ ) :**

$$\text{Card}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in U_k} \dots \sum \text{Card}\left(\bigcap_{u=1}^k A_{i_u}\right),$$

où  $U_k = \{(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k; i_1 < \dots < i_k\}$ .

**Propriétés :**

$$\text{Card}(\emptyset) = 0, \quad A \cap B = \emptyset \Rightarrow \text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B),$$

$$\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(\complement_{\Omega} A) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(A), \quad \text{Card}(A) = \text{Card}(A \cap B) + \text{Card}(A \cap \overline{B}),$$

$$\text{Card}(A - B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B), \quad A \subseteq B \Rightarrow \text{Card}(A) \leq \text{Card}(B),$$

$$\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \text{Card}(B).$$

**Principe additif :** On considère une situation qui nous amène à faire un choix parmi  $n$  cas différents et exclusifs : le cas 1, ou le cas 2... , ou le cas  $n$ . Si, pour tout  $k \in \{1, \dots, n\}$ , il y a  $u_k$  possibilités pour le  $k$ -ème cas, alors le nombre total de possibilités est  $\sum_{k=1}^n u_k$ .

**Principe multiplicatif** : On considère une situation conjuguant  $k$  étapes : une étape 1, et une étape 2... , et une étape  $k$ . Si, pour tout  $i \in \{1, \dots, k\}$ , il y a  $n_i$  possibilités pour la  $k$ -ème étape, alors le nombre total de possibilités est  $\prod_{i=1}^k n_i$ .

**Liste** : Liste ordonnée d'éléments avec répétitions.

**Arrangement** : Liste ordonnée d'éléments sans répétition.

**Permutation** : Arrangement de  $n$  éléments parmi  $n$ .

**Combinaison** : Partie d'un ensemble ; l'ordre n'est pas pris en compte.

**Exemple : choix de 2 éléments parmi  $\Omega = \{a, b, c\}$**  :

Choix	avec répétition	sans répétition
avec ordre	<p style="text-align: center;"><b>Listes :</b></p> $\left. \begin{array}{l} (a, a) \quad (a, b) \quad (a, c) \\ (b, a) \quad (b, b) \quad (b, c) \\ (c, a) \quad (c, b) \quad (c, c) \end{array} \right\} 9$	<p style="text-align: center;"><b>Arrangements :</b></p> $\left. \begin{array}{l} (a, b) \quad (a, c) \\ (b, a) \quad (b, c) \\ (c, a) \quad (c, b) \end{array} \right\} 6$
sans ordre	<p style="text-align: center;"><b>Combinaisons avec répétitions :</b></p> $\left. \begin{array}{l} [a, a] \quad [a, b] \quad [a, c] \\ [b, b] \quad [b, c] \quad [c, c] \end{array} \right\} 6$	<p style="text-align: center;"><b>Combinaisons :</b></p> $\{a, b\} \quad \{a, c\} \quad \{b, c\} \quad \left. \right\} 3$

Les permutations des éléments des 3 éléments de  $\Omega$  sont :  $(a, b, c)$ ,  $(b, a, c)$ ,  $(a, c, b)$ ,  $(b, c, a)$ ,  $(c, a, b)$ ,  $(c, b, a)$ . Il y en a 6.

**Nombre de listes** : Le nombre de listes possibles de  $k$  éléments parmi  $n$  est  $n^k$ .

**Factorielle** : On appelle factorielle  $n$  l'entier :

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times (n - 1) \times n = \prod_{i=1}^n k.$$

On pose  $0! = 1$ .

**Nombre de permutations** : Le nombre de permutations de  $n$  éléments est  $n!$ .



**Nombre d'arrangements :** On appelle nombre d'arrangements " $k$  parmi  $n$ " l'entier :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

C'est le nombre d'arrangements possibles de  $k$  éléments parmi  $n$ .

**Coefficient binomial :** On appelle coefficient binomial " $k$  parmi  $n$ " l'entier :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Si  $k \notin \{0, \dots, n\}$ , on pose  $\binom{n}{k} = 0$ .

**Nombre de combinaisons :** Le nombre de combinaisons possibles de  $k$  éléments parmi  $n$  est  $\binom{n}{k}$ .

## 2 Calculs utiles

### Propriétés du coefficient binomial :

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}, \quad k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

### Formule du binôme de Newton :

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

### Formule de Vandermonde :

$$\sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j} = \binom{n+m}{k}.$$

### Somme des $n$ premiers entiers, de leurs carrés et de leurs cubes :

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

### Somme des $n$ premiers termes d'une suite géométrique :

$$\sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{si } x \in \mathbb{R} - \{1\}, \\ n+1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

### Série géométrique et ses dérivées :

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad x \in ]-1, 1[.$$

### Série géométrique et ses dérivées ; généralisation :

$$\sum_{k=m}^{\infty} \prod_{i=0}^{m-1} (k-i)x^{k-m} = \frac{m!}{(1-x)^{m+1}}, \quad x \in ]-1, 1[.$$

**Formule du binôme négatif :**

$$\sum_{k=r}^{\infty} \binom{k}{r} x^{k-r} = \frac{1}{(1-x)^{r+1}}, \quad x \in ]-1, 1[.$$

**Série entière de la fonction exponentielle :**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Sommes doubles :**

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^p a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^p \left( \sum_{i=1}^n a_{i,j} \right), \quad \sum_{i=0}^n \left( \sum_{j=0}^i a_{i,j} \right) = \sum_{j=0}^n \left( \sum_{i=j}^n a_{i,j} \right).$$

### 3 Espaces probabilisés et probabilités

**Expérience aléatoire** : On appelle expérience aléatoire toute expérience dont on connaît parfaitement les conditions mais dont on ne peut pas prévoir l'issue. Elle est notée  $\mathcal{E}$ .

**Univers** : On appelle univers d'une expérience aléatoire  $\mathcal{E}$  l'ensemble des issues possibles. Un univers est noté  $\Omega$ .

**Événement** : On appelle événement toute partie de l'univers  $\Omega$ . Les événements sont notés par des lettres majuscules :  $A, B, C, \dots$

On dit qu'un événement  $A$  se réalise (ou est réalisé) lors d'une expérience aléatoire si et seulement si l'issue de cette expérience aléatoire appartient à  $A$ .

**Vocabulaires** :

Notations	Lire	Vocabulaires
$\emptyset$	.	événement impossible
$\Omega$	grand omega	univers (ou événement certain)
$\omega$	omega	issue
$\{\omega\}$	singleton omega	événement élémentaire
$A$	.	événement
$\omega \in A$	omega dans $A$	$\omega$ est une réalisation possible de $A$
$\bar{A}$	$A$ barre	événement contraire de $A$
$A \cup B$	$A$ union $B$	réalisation de $A$ , ou $B$ , ou les deux
$A \cap B$	$A$ inter $B$	réalisation de $A$ et $B$
$A - B$	$A$ privé de $B$	réalisation de $A$ et $\bar{B}$
$A \cap B = \emptyset$	.	$A$ et $B$ sont incompatibles
$A \subset B$	$A$ inclus dans $B$	$A$ implique $B$

Toutes les opérations vues sur les ensembles sont aussi valables pour les événements. En particulier,  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} =$  "ni  $A$ , ni  $B$  se réalise" et  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ .

**Système complet d'événements** :  $(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  forme un système complet d'événements  $\Leftrightarrow$

$$(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}} \text{ sont incompatibles deux à deux et } \bigcup_{k=1}^n A_k = \Omega.$$

**Tribu** : On dit que  $\mathcal{A}$  est une tribu de l'univers  $\Omega$  si, et seulement si,

- $\Omega \in \mathcal{A}$ ,
  - pour tout  $A \in \mathcal{A}$ ,  $\bar{A} \in \mathcal{A}$ ,
  - pour toute famille d'événements  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  tels que, pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $A_k \in \mathcal{A}$ , on a  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}$ .
- Si  $\Omega$  est fini ou infini dénombrable, on prend  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$  (l'ensemble des parties de  $\Omega$ ).

**Probabilité  $\mathbb{P}$**  : On appelle probabilité définie sur  $(\Omega, \mathcal{A})$  toute application  $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

- pour tout  $A \in \mathcal{A}$ ,  $\mathbb{P}(A) \in [0, 1]$ ,
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ ,
- pour toute suite d'événements  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$  incompatibles deux à deux,

$$\mathbb{P} \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k).$$

Si  $\Omega$  est fini, on peut remplacer le dernier point par :  $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ .

Le réel  $\mathbb{P}(A)$ , prononcer "P de A", est la probabilité que l'événement  $A$  se réalise.

**Probabilité sur un univers dénombrable** : Soient  $\Omega$  un univers fini ou infini dénombrable (comme, par exemple,  $\Omega = \mathbb{N}$ ), et  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$  l'ensemble des parties de  $\Omega$ . Si l'application  $\mathbb{Q} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifie :

- pour tout  $\omega \in \Omega$ ,  $\mathbb{Q}(\{\omega\}) \geq 0$ ,
  - $\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{Q}(\{\omega\}) = 1$ ,
  - pour tout  $A \in \mathcal{A}$ ,  $\mathbb{Q}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{Q}(\{\omega\})$ ,
- alors  $\mathbb{Q}$  est une probabilité définie sur  $(\Omega, \mathcal{A})$ .

**Espace probabilisé** : Le triplet  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  est appelé espace probabilisé.

**Propriétés** :

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A),$$

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B}), \quad A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

**Formule d'inclusion-exclusion :**

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

**Formule d'inclusion-exclusion (à 3 termes) :**

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

**Formule d'inclusion-exclusion (à  $n$  termes) :**

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in U_k} \mathbb{P}\left(\bigcap_{u=1}^k A_{i_u}\right),$$

où  $U_k = \{(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k; i_1 < \dots < i_k\}$ .

**Cas particulier :**  $(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  incompatibles deux à deux  $\Rightarrow$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k).$$

**Inégalité :** On a toujours

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k).$$

**Propriétés de limite monotone :**

$$A_{n+1} \subset A_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right),$$

$$A_n \subset A_{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right).$$

**Équiprobabilité :** Si aucun événement élémentaire n'a plus de chance de se réaliser que les autres, on dit qu'il y a équiprobabilité.

**Probabilité uniforme** : Si  $\Omega$  est fini et qu'il y a équiprobabilité, alors on peut considérer l'espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ , où  $\mathbb{P}$  désigne la probabilité uniforme définie par

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}, \quad A \in \mathcal{A}.$$

Autrement écrit, on a  $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Nombre d'événements élémentaires formant } A}{\text{Nombre d'événements élémentaires formant } \Omega}$ .

## 4 Probabilités conditionnelles et indépendance

**Probabilité (conditionnelle) de  $A$  sachant  $B$**  : L'application  $\mathbb{P}_B : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$  définie par

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad A \in \mathcal{A},$$

est une probabilité.

Le réel  $\mathbb{P}_B(A)$ , prononcer "P de A sachant B", est la probabilité que l'événement  $A$  se réalise sachant que l'événement  $B$  est réalisé (avec  $\mathbb{P}(B) \neq 0$ ).

**Retournement du conditionnement** :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}_A(B)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = c\mathbb{P}_A(B), \quad \text{avec } c = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

**Formule des probabilités composées (à l'ordre 3)** :

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)\mathbb{P}_{A \cap B}(C).$$

**Formule des probabilités totales** :


$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}_B(A)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}_{\bar{B}}(A)\mathbb{P}(\bar{B}).$$

**Formule de Bayes** :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}_A(B)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}_A(B)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}_{\bar{A}}(B)\mathbb{P}(\bar{A})}.$$



**Arbre de probabilité** : Un arbre de probabilité est un schéma permettant de résumer une expérience aléatoire. Il sert à calculer des probabilités. La construction d'arbre de probabilité avec deux événements  $A$  et  $B$  est



Le vocabulaire associé est assez intuitif (branche, nœud, chemin...).

Ainsi, la pondération de la branche allant du nœud  $A$  vers le nœud  $B$  est la probabilité que  $B$  se réalise sachant que  $A$  est réalisé :  $\mathbb{P}_A(B)$ . Cet arbre possède les particularités suivantes :

- La somme des probabilités sur les branches d'un même nœud vaut 1. Par exemple :  $\mathbb{P}(\bar{A}) + \mathbb{P}(A) = 1$ .
- La "probabilité d'un chemin" ( $\mathbb{P}(A \cap B)$ ,  $\mathbb{P}(A \cap \bar{B})$ ...) est le produit des probabilités de ses branches. Par exemple :  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_A(B)\mathbb{P}(A)$ .
- *Conséquence de la formule des probabilités totales* : La probabilité qu'un évènement se réalise est la somme des probabilités des chemins qui y amènent. Par exemple :  $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B})$ .

**Formule des probabilités composées (à l'ordre  $n$ ) :**

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^n \mathbb{P}_{\bigcap_{k=1}^{i-1} A_k}(A_i).$$

**Formule des probabilités totales (à l'ordre  $n$ ) :**  $(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  système complet d'événements  $\Rightarrow$

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_{A_k}(B) \mathbb{P}(A_k).$$

**Formule de Bayes (à l'ordre  $n$ ) :**  $(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  système complet d'événements  $\Rightarrow$

$$\mathbb{P}_B(A_i) = \frac{\mathbb{P}_{A_i}(B) \mathbb{P}(A_i)}{\sum_{k=1}^n \mathbb{P}_{A_k}(B) \mathbb{P}(A_k)}.$$

**Indépendance :**

- $A$  et  $B$  indépendants  $\Leftrightarrow$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \Leftrightarrow \mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A) \Leftrightarrow \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B).$$

- $A$  et  $B$  indépendants  $\Leftrightarrow \bar{A}$  et  $B$  indépendants  $\Leftrightarrow A$  et  $\bar{B}$  indépendants  $\Leftrightarrow \bar{A}$  et  $\bar{B}$  indépendants
- $(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  indépendants deux à deux  $\Leftrightarrow$  pour tout  $(k, l) \in \{1, \dots, n\}^2$  avec  $k \neq l$ ,

$$\mathbb{P}(A_k \cap A_l) = \mathbb{P}(A_k) \mathbb{P}(A_l).$$

- $(A_k)_{k \in \{1, \dots, n\}}$  indépendants  $\Leftrightarrow$  pour tout  $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,

$$\mathbb{P} \left( \bigcap_{k \in I} A_k \right) = \prod_{k \in I} \mathbb{P}(A_k).$$

**Dorénavant, on suppose construit un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  adapté à l'expérience aléatoire sous-jacente.**

## 5 Variables aléatoires réelles (*var*) discrètes

**Variable aléatoire réelle (*var*) :** Une *var*  $X$  est une application  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  telle que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\{X \leq x\} = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{A}$ .

**Support d'une *var* :** Le support d'une *var*  $X$  est l'ensemble des valeurs atteintes par  $X$ .

Il est noté  $X(\Omega)$ .

**Loi d'une *var* :** La loi d'une *var*  $X$  est la probabilité  $\mathbb{P}_X$  définie par

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\}), A \subseteq \mathbb{R}.$$

**Var discrète :**

- On appelle *var* discrète toute *var* prenant un ensemble de valeurs fini, ou infini dénombrable.
- La loi d'une *var* discrète  $X$  est donnée par

$$\mathbb{P}(X = k), \quad k \in X(\Omega),$$

où  $\mathbb{P}(X = k)$  désigne la probabilité que l'événement  $\{X = k\} = \{\omega \in \Omega; X(\omega) = k\}$  se réalise.

**Propriétés :**

$$\sum_{k \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = k) = 1, \quad \mathbb{P}(X \in \mathcal{D}) = \sum_{k \in X(\Omega) \cap \mathcal{D}} \mathbb{P}(X = k).$$

**Exemples :**

On adopte la notation :  $X \sim \dots \Leftrightarrow X$  suit la loi  $\dots$

Loi	uniforme	de Bernoulli	binomiale	géométrique	de Poisson
paramètres	$n \in \mathbb{N}^*$	$p \in ]0, 1[$	$n \in \mathbb{N}^*, p \in ]0, 1[$	$p \in ]0, 1[$	$\lambda > 0$
$X \sim$	$\mathcal{U}(\{1, \dots, n\})$	$\mathcal{B}(p)$	$\mathcal{B}(n, p)$	$\mathcal{G}(p)$	$\mathcal{P}(\lambda)$
$X(\Omega)$ ( $k \in$ )	$\{1, \dots, n\}$	$\{0, 1\}$	$\{0, \dots, n\}$	$\mathbb{N}^*$	$\mathbb{N}$
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{n}$	$p$ si $k = 1$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$p(1-p)^{k-1}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

**Caractérisation :**  $q_k, k \in \mathcal{D}$ , caractérise la loi d'une *var* discrète  $\Leftrightarrow q_k \geq 0$ , et

$$\sum_{k \in \mathcal{D}} q_k = 1.$$

**Loi et probabilité uniforme :**  $\mathbb{P}$  probabilité uniforme  $\Rightarrow$

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\text{Card}(\{X = k\})}{\text{Card}(\Omega)}, \quad k \in X(\Omega).$$

**Égalité en loi :**  $X$  et  $Y$  suivent la même loi  $\Leftrightarrow X(\Omega) = Y(\Omega)$  et

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k), \quad k \in X(\Omega).$$

**Fonction de répartition :**

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{k \in ]-\infty, x] \cap X(\Omega)} \mathbb{P}(X = k), \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Fonction de répartition et loi :** Pour tout  $k \in X(\Omega)$ , on a

$$\mathbb{P}(X = k) = F(k) - F(k_*),$$

où  $k_*$  est la plus grande valeur de  $X(\Omega)$  vérifiant  $k_* < k$ .

**Espérance :**

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k \in X(\Omega)} k \mathbb{P}(X = k).$$

**Formule du transfert :**

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{k \in X(\Omega)} g(k) \mathbb{P}(X = k).$$

**Propriétés :**

- $\mathbb{E}(a) = a$ ,
- $X(\Omega) \subseteq [0, \infty[ \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq 0$ ,
- $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ ,

◦  $\mathbb{E}(aX^2 + bX + c) = a\mathbb{E}(X^2) + b\mathbb{E}(X) + c.$

**Moment d'ordre  $p$  :**

$$m_p = \mathbb{E}(X^p) = \sum_{k \in X(\Omega)} k^p \mathbb{P}(X = k).$$

**Variance :**

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

**Propriétés :**

- $\mathbb{V}(X) \geq 0,$
- $\mathbb{V}(X) = 0 \Leftrightarrow X$  est une *var* constante,
- $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X).$

**Formule de König-Huyghens :**

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

**Exemples :**

$X \sim$	$\mathcal{U}(\{1, \dots, n\})$	$\mathcal{B}(p)$	$\mathcal{B}(n, p)$	$\mathcal{G}(p)$	$\mathcal{P}(\lambda)$
$\mathbb{E}(X)$	$\frac{n+1}{2}$	$p$	$np$	$\frac{1}{p}$	$\lambda$
$\mathbb{V}(X)$	$\frac{n^2-1}{12}$	$p(1-p)$	$np(1-p)$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\lambda$

**Écart-type :**

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

**Inégalité de Markov :** Soit  $h : \mathbb{R} \rightarrow ]0, \infty[$  une fonction croissante. Pour tout  $\epsilon > 0$ , on a

$$\mathbb{P}(|X| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(h(|X|))}{h(\epsilon)}.$$

**Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :** Pour tout  $\epsilon > 0$ , on a

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\epsilon^2}.$$

**Fonction génératrice :**

$$G(s) = \mathbb{E}(s^X) = \sum_{k \in X(\Omega)} s^k \mathbb{P}(X = k), \quad s \in [-1, 1].$$

**Fonction génératrice et ses dérivées :**

$$G'(s) = \mathbb{E}(X s^{X-1}), \quad G''(s) = \mathbb{E}(X(X-1)s^{X-2}), \quad G^{(k)}(s) = \mathbb{E}\left(\prod_{i=0}^{k-1} (X-i)s^{X-k}\right).$$

**Propriétés :**

$$\mathbb{E}(X) = G'(1), \quad \mathbb{V}(X) = G''(1) + G'(1) - (G'(1))^2.$$

**Fonction génératrice et loi :**

- Si  $X(\Omega) \subseteq \mathbb{N}$  et

$$G(s) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k,$$

alors  $X(\Omega) = \{k \in \mathbb{N}; a_k \neq 0\}$  et la loi de  $X$  est donnée par

$$\mathbb{P}(X = k) = a_k, \quad k \in X(\Omega).$$

- Si  $X(\Omega) \subseteq \mathbb{N}$ , alors  $X(\Omega) = \{m \in \mathbb{N}; G^{(m)}(0) \neq 0\}$  et la loi de  $X$  est donnée par

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{G^{(k)}(0)}{k!}, \quad k \in X(\Omega).$$

**Fonction génératrice et égalité en loi :**  $X$  et  $Y$  suivent la même loi  $\Leftrightarrow G_X(s) = G_Y(s)$  pour tout  $s \in [-1, 1]$ .

**Exemples :**

$X \sim$	$\mathcal{U}(\{1, \dots, n\})$	$\mathcal{B}(p)$	$\mathcal{B}(n, p)$	$\mathcal{G}(p)$	$\mathcal{P}(\lambda)$
$G(s)$	$\frac{s}{n} \left( \frac{1-s^n}{1-s} \right)$	$1 + p(s-1)$	$(1 + p(s-1))^n$	$\frac{ps}{1 - (1-p)s}$	$e^{\lambda(s-1)}$

## 6 Lois discrètes usuelles

**Loi de Rademacher** :  $X$  suit la loi de Rademacher  $\mathcal{R}(a)$ ,  $a > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = \{-a, a\}$ ,

$$\mathbb{P}(X = -a) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = a) = \frac{1}{2}.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = 0, \quad \mathbb{V}(X) = a^2.$$

**Loi uniforme (discrète)** :  $X$  suit la loi uniforme  $\mathcal{U}(\{m, \dots, n\})$ ,  $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ ,  $m < n \Leftrightarrow$

$$X(\Omega) = \{m, \dots, n\},$$

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n + 1 - m}, \quad k \in \{m, \dots, n\}.$$

Quand  $m = 1$ ,  $X(\Omega) = \{1, \dots, n\}$  et

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k \in \{1, \dots, n\}.$$

Espérance et variance pour le cas  $m = 1$  :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n + 1}{2}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

**Loi de Bernoulli** :  $X$  suit la loi de Bernoulli  $\mathcal{B}(p)$ ,  $p \in ]0, 1[ \Leftrightarrow X(\Omega) = \{0, 1\}$ ,

$$\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p, \quad \mathbb{P}(X = 1) = p.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = p, \quad \mathbb{V}(X) = p(1 - p).$$

**Loi binomiale :**  $X$  suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $p \in ]0, 1[ \Leftrightarrow X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$ ,

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

(On a  $\mathcal{B}(1, p) = \mathcal{B}(p)$ ).

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \mathbb{V}(X) = np(1-p).$$

**Loi hypergéométrique :**  $X$  suit la loi hypergéométrique  $\mathcal{H}(l, m, n)$ ,  $(l, m, n) \in (\mathbb{N}^*)^3 \Leftrightarrow$

$X(\Omega) \subseteq \{0, \dots, n\}$ ,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{l}{k} \binom{m}{n-k}}{\binom{m+l}{n}}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{nl}{l+m}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{nlm(l+m-n)}{(l+m)^2(l+m-1)}.$$

**Loi géométrique :**  $X$  suit la loi géométrique  $\mathcal{G}(p) \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ ,

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

**Loi de Pascal :**  $X$  suit la loi de Pascal  $\mathcal{G}(r, p)$ ,  $r \in \mathbb{N}^*$ ,  $p \in ]0, 1[ \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{N} - \{0, \dots, r-1\}$ ,

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k \in \mathbb{N} - \{0, \dots, r-1\}.$$

(On a  $\mathcal{G}(1, p) = \mathcal{G}(p)$ ).



Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{p}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

**Loi binomiale négative :**  $X$  suit la loi binomiale négative  $\mathcal{B}_{neg}(r, p)$ ,  $r \in \mathbb{N}^*$ ,  $p \in ]0, 1[ \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{N}$ ,

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r(1-p)}{p}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

**Loi de Poisson :**  $X$  suit la loi de Poisson  $\mathcal{P}(\lambda)$ ,  $\lambda > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{N}$ ,

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \quad \mathbb{V}(X) = \lambda.$$

### Approximations

◦ Si  $p = \frac{l}{l+m}$  et  $n \leq \frac{l+m}{10}$ , alors

$$\mathcal{H}(l, m, n) \approx \mathcal{B}(n, p),$$

◦ Si  $n \geq 31$  et  $np \leq 10$ , alors

$$\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{P}(np).$$

## 7 Modélisation

### Schéma d'urne :

- *Tirages avec remise.* Une urne contient  $N$  boules dont  $N_1$  sont blanches et  $N_2 = N - N_1$  sont noires. On effectue des tirages au hasard et avec remise.

- La *var*  $X$  égale au nombre de boules blanches obtenues en  $n$  tirages suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  avec  $p = \frac{N_1}{N}$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{N_1}{N}\right)^k \left(1 - \frac{N_1}{N}\right)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

- La *var*  $X$  égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir pour la première fois une boule blanche suit la loi géométrique  $\mathcal{G}(p)$  avec  $p = \frac{N_1}{N}$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{N_1}{N} \left(1 - \frac{N_1}{N}\right)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

- La *var*  $X$  égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir  $r$  boules blanches,  $r \in \{1, \dots, N_1\}$ , suit la loi de Pascal  $\mathcal{G}(r, p)$  avec  $p = \frac{N_1}{N}$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} \left(\frac{N_1}{N}\right)^r \left(1 - \frac{N_1}{N}\right)^{k-r}, \quad k \in \mathbb{N} - \{0, \dots, r-1\}.$$

- La *var*  $X$  égale au nombre de boules noires tirées avant d'obtenir  $r$  boules blanches,  $r \in \{1, \dots, N_1\}$ , suit la loi binomiale négative  $\mathcal{B}_{neg}(r, p)$  avec  $p = \frac{N_1}{N}$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+r-1}{r-1} \left(\frac{N_1}{N}\right)^r \left(1 - \frac{N_1}{N}\right)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

- *Tirages simultanés.* Une urne contient  $N$  boules dont  $N_1$  sont blanches et  $N_2 = N - N_1$  sont noires.

On tire au hasard et simultanément  $n$  boules de l'urne. La  $\text{var } X$  égale au nombre de boules blanches obtenues suit la loi hypergéométrique  $\mathcal{H}(N_1, N_2, n)$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

**Répétition d'expériences :** On répète, dans les mêmes conditions, une même expérience aléatoire au cours de laquelle un événement  $A$  a une probabilité  $p$  d'être réalisé.

- La  $\text{var } X$  égale au nombre de réalisations de l'événement  $A$  en  $n$  expériences (indépendantes) suit la loi binomiale  $\mathcal{B}(n, p)$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

- La  $\text{var } X$  égale au nombre d'expériences (indépendantes) nécessaires pour obtenir une réalisation de  $A$  suit la loi géométrique  $\mathcal{G}(p)$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

- La  $\text{var } X$  égale au nombre d'expériences (indépendantes) nécessaires pour obtenir exactement  $r$  réalisations de  $A$  suit la loi de Pascal  $\mathcal{G}(r, p)$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k \in \mathbb{N} - \{0, \dots, r-1\}.$$

- La  $\text{var } X$  égale au nombre d'expériences (indépendantes) nécessaires pour que  $A$  ne se réalise pas avant  $r$  réalisations de  $A$  suit la loi binomiale négative  $\mathcal{B}_{neg}(r, p)$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

## 8 Couples de *var* discrètes

**Couple de *var* :** Soient  $X$  et  $Y$  deux *var*. On appelle couple de *var* l'application  $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$  vérifiant  $(X, Y)(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$ ,  $\omega \in \Omega$ .

**Support d'un couple de *var* :** Le support d'un couple de *var*  $(X, Y)$  est l'ensemble des valeurs atteintes par  $(X, Y)$ . Il est noté  $(X, Y)(\Omega)$ .

**Loi d'un couple de *var* :** La loi d'un couple de *var*  $(X, Y)$  est la probabilité  $\mathbb{P}_{(X, Y)}$  définie par

$$\mathbb{P}_{(X, Y)}(A) = \mathbb{P}((X, Y) \in A) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega; (X, Y)(\omega) \in A\}), \quad A \subseteq \mathbb{R}^2.$$

**Couple de *var* discrètes :**

- On appelle couple de *var* discrètes tout couple de *var*  $(X, Y)$  prenant un ensemble de valeurs fini, ou infini dénombrable. Dès lors,  $X$  est une *var* discrète et  $Y$  aussi.
- La loi d'un couple de *var* discrètes  $(X, Y)$  est donnée par

$$\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}), \quad (i, j) \in (X, Y)(\Omega).$$

On la présente parfois sous la forme d'un tableau quand cela est possible.

**Propriétés :**

$$\sum_{(i, j) \in (X, Y)(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = 1, \quad \mathbb{P}((X, Y) \in \mathcal{D}) = \sum_{(i, j) \in (X, Y)(\Omega) \cap \mathcal{D}} \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}).$$

**Caractérisation :**  $q_{i, j}$ ,  $(i, j) \in \mathcal{D}$ , caractérise la loi d'un couple de *var* discrètes  $\Leftrightarrow q_{i, j} \geq 0$  et

$$\sum_{(i, j) \in \mathcal{D}} q_{i, j} = 1.$$

**Loi et probabilité uniforme :**  $\mathbb{P}$  probabilité uniforme  $\Rightarrow$

$$\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \frac{\text{Card}(\{X = i\} \cap \{Y = j\})}{\text{Card}(\Omega)}, \quad (i, j) \in (X, Y)(\Omega).$$

**Loi et probabilité conditionnelle :**

$$\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \begin{cases} \mathbb{P}_{\{Y=j\}}(X = i)\mathbb{P}(Y = j), \\ \mathbb{P}_{\{X=i\}}(Y = j)\mathbb{P}(X = i), \end{cases} \quad (i, j) \in (X, Y)(\Omega).$$

**Fonction de répartition :**

$$F(x, y) = \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

**Lois marginales :**

- On a  $X(\Omega) = \bigcup_{i \in \mathbb{R}} \{i \in \mathbb{R}; \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) \neq 0\}$ ,

la loi de  $X$  est donnée par

$$\mathbb{P}(X = i) = \sum_{j \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}), \quad i \in X(\Omega).$$

- On a  $Y(\Omega) = \bigcup_{j \in \mathbb{R}} \{j \in \mathbb{R}; \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) \neq 0\}$ ,

la loi de  $Y$  est donnée par

$$\mathbb{P}(Y = j) = \sum_{i \in X(\Omega)} \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}), \quad j \in Y(\Omega).$$

**Indépendance des *var*  $X$  et  $Y$  :**  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Leftrightarrow (X, Y)(\Omega) = X(\Omega) \times Y(\Omega)$  et, pour

tout  $(i, j) \in (X, Y)(\Omega)$ ,

$$\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \mathbb{P}(X = i)\mathbb{P}(Y = j).$$

**Sur l'indépendance :**

- S'il existe  $(i_0, j_0) \in (X, Y)(\Omega)$  tel que  $\mathbb{P}(\{X = i_0\} \cap \{Y = j_0\}) \neq \mathbb{P}(X = i_0)\mathbb{P}(Y = j_0)$ , alors  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.

- S'il existe deux suites de réels positifs  $(a_i)_{i \in X(\Omega)}$  et  $(b_j)_{j \in Y(\Omega)}$  telles que

$$\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = a_i b_j, \quad \sum_{i \in X(\Omega)} a_i = 1, \quad \sum_{j \in Y(\Omega)} b_j = 1,$$

alors  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, et la loi de  $X$  est donnée par  $\mathbb{P}(X = i) = a_i, i \in X(\Omega)$  et la loi de  $Y$  est donnée par  $\mathbb{P}(Y = j) = b_j, j \in Y(\Omega)$ .

- $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow \mathbb{P}(\{X \in \mathcal{D}_1\} \cap \{Y \in \mathcal{D}_2\}) = \mathbb{P}(X \in \mathcal{D}_1)\mathbb{P}(Y \in \mathcal{D}_2)$ .
- $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow g(X)$  et  $h(Y)$  indépendantes.

**"Indépendantes et identiquement distribuées" / iid :** On dit que  $X$  et  $Y$  sont *iid* quand elles sont "indépendantes et identiquement distribuées". La mention "identiquement distribuées" signifie "suivent la même loi".

**Loi d'une somme de deux *var* indépendantes (produit de convolution) :**

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i \in X(\Omega)} \mathbb{P}(Y = k - i)\mathbb{P}(X = i), \quad k \in (X + Y)(\Omega).$$

**Exemples :**

$X_i \sim$	$\mathcal{B}(p)$	$\mathcal{B}(m_i, p)$	$\mathcal{P}(\lambda_i)$	$\mathcal{G}(p)$
$X_1 + X_2 \sim$	$\mathcal{B}(2, p)$	$\mathcal{B}(m_1 + m_2, p)$	$\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$	$\mathcal{G}(2, p)$

**Formule du transfert :**

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \sum_{(i,j) \in (X,Y)(\Omega)} g(i, j)\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}).$$

**Linéarité de l'espérance :**

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y).$$

**Inégalité de Cauchy-Schwarz :**

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}.$$

**Moments et indépendance :**  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow$

$$\mathbb{E}(g(X)h(Y)) = \mathbb{E}(g(X))\mathbb{E}(h(Y)).$$

En particulier,  $\mathbb{E}(X^k Y^m) = \mathbb{E}(X^k)\mathbb{E}(Y^m)$ .

**Fonction génératrice :** Si  $(X, Y)(\Omega) \subseteq \mathbb{N}^2$ ,

$$G(s, t) = \mathbb{E}(s^X t^Y) = \sum_{(i,j) \in (X,Y)(\Omega)} s^i t^j \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}), \quad (s, t) \in [-1, 1]^2.$$

**Propriétés :**

$$G(s, 1) = G_X(s), \quad G(1, t) = G_Y(t), \quad G(s, s) = G_{X+Y}(s), \quad \mathbb{E}(XY) = \frac{\partial^2 G}{\partial s \partial t}(1, 1).$$

**Fonction génératrice et loi :**

◦ Si  $(X, Y)(\Omega) \subseteq \mathbb{N}^2$  et

$$G(s, t) = \sum_{i \in K} \sum_{j \in L} a_{i,j} s^i t^j,$$

alors  $(X, Y)(\Omega) = \{(i, j) \in K \times L; a_{i,j} \neq 0\}$  et la loi de  $(X, Y)$  est donnée par

$$\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = a_{i,j}, \quad (i, j) \in (X, Y)(\Omega).$$

◦ Si  $(X, Y)(\Omega) \subseteq \mathbb{N}^2$  alors  $(X, Y)(\Omega) = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2; \frac{\partial^{i+j} G}{\partial s^i \partial t^j}(0, 0) \neq 0\}$  et la loi de  $(X, Y)$  est donnée par

$$\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j} G}{\partial s^i \partial t^j}(0, 0), \quad (i, j) \in (X, Y)(\Omega).$$

**Fonction génératrice et indépendance :**  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Leftrightarrow G(s, t) = G_X(s)G_Y(t)$  pour tout  $(s, t) \in [-1, 1]^2$ .

**Covariance :**

$$\mathbb{C}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

**Matrice de covariance :**

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathbb{V}(X) & \mathbb{C}(X, Y) \\ \mathbb{C}(Y, X) & \mathbb{V}(Y) \end{pmatrix}.$$

**Variance d'une somme de *var* :**

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\mathbb{C}(X, Y).$$

**Propriétés :**

- $\mathbb{C}(X, Y) = \mathbb{C}(Y, X)$ ,
- $\mathbb{C}(X, a) = 0$ ,
- $\mathbb{C}(aX + b, cY + d) = ac\mathbb{C}(X, Y)$ ,
- $\mathbb{C}(aX + bY, cU + dV) = ac\mathbb{C}(X, U) + ad\mathbb{C}(X, V) + bc\mathbb{C}(Y, U) + bd\mathbb{C}(Y, V)$ ,
- $|\mathbb{C}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$ .

**Paramètres d'un couple de *var* :** Les principaux paramètres d'un couple de *var* (vecteur colonne)

$U = (X, Y)^t$  sont son espérance :  $\mathbb{E}_2(U) = (\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y))^t$ , et sa matrice de covariance  $\Sigma$ .

**Covariance, variance et indépendance :**  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow$

- $\mathbb{C}(X, Y) = 0$ ,
- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ .

Si  $\mathbb{C}(X, Y) = 0$ , on ne peut rien conclure sur l'indépendance des *var*  $X$  et  $Y$ .

**Coefficient de corrélation linéaire :**

$$\rho(X, Y) = \frac{\mathbb{C}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

On a  $\rho(X, Y) \in [-1, 1]$ . Plus  $|\rho(X, Y)|$  est proche de 1, plus la dépendance linéaire entre  $X$  et  $Y$  est forte.



## 9 Vecteurs de *var* discrètes

**Vecteur de *var* :** Soient  $X_1, \dots, X_n$  *n var*. On appelle vecteur de *var* l'application  $(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  vérifiant  $(X_1, \dots, X_n)(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ ,  $\omega \in \Omega$ .

**Support d'un vecteur de *var* :** Le support d'un vecteur de *var*  $(X_1, \dots, X_n)$  est l'ensemble des valeurs atteintes par  $(X_1, \dots, X_n)$ . Il est noté  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$ .

**Loi d'un vecteur de *var* :** La loi d'un vecteur de *var*  $(X_1, \dots, X_n)$  est la probabilité  $\mathbb{P}_{(X_1, \dots, X_n)}$  définie par  $\mathbb{P}_{(X_1, \dots, X_n)}(A) = \mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in A) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega; (X_1, \dots, X_n)(\omega) \in A\})$ ,  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ .

**Vecteur de *var* discrètes :**

- On appelle vecteur de *var* discrètes tout vecteur de *var*  $(X_1, \dots, X_n)$  prenant un ensemble de valeurs fini, ou infini dénombrable. Dès lors, pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $X_i$  est une *var* discrète.
- La loi de  $(X_1, \dots, X_n)$  est donnée par

$$\mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i = u_i\} \right), \quad (u_1, \dots, u_n) \in (X_1 \dots X_n)(\Omega).$$

**Propriétés :**  $\sum_{(u_1, \dots, u_n) \in (X_1, \dots, X_n)(\Omega)} \dots \sum \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i = u_i\} \right) = 1$ ,

$$\mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{D}) = \sum_{(u_1, \dots, u_n) \in (X_1, \dots, X_n)(\Omega) \cap \mathcal{D}} \dots \sum \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i = u_i\} \right).$$

**Caractérisation :**  $q_{u_1, \dots, u_n}$ ,  $(u_1, \dots, u_n) \in \mathcal{D}$  caractérise la loi d'un vecteur de *var* discrètes  $\Leftrightarrow$

$$q_{u_1, \dots, u_n} \geq 0 \text{ et } \sum_{(u_1, \dots, u_n) \in \mathcal{D}} \dots \sum q_{u_1, \dots, u_n} = 1.$$

**Loi marginale d'une *var* composante de  $(X_1, \dots, X_n)$  :** La loi de  $X_1$  est donnée par

$$\mathbb{P}(X_1 = u_1) = \sum_{(u_2, \dots, u_n) \in (X_2, \dots, X_n)(\Omega)} \dots \sum \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i = u_i\} \right), \quad u_1 \in X_1(\Omega).$$

On définit de la même manière les lois marginales des autres *var*  $X_2, \dots, X_n$ .

**Loi de vecteurs de *var* composantes de  $(X_1, \dots, X_n)$  :** La loi de  $(X_1, X_2)$  est donnée par

$$\mathbb{P}(\{X_1 = u_1\} \cap \{X_2 = u_2\}) = \sum_{(u_3, \dots, u_n) \in (X_3, \dots, X_n)(\Omega)} \dots \sum_{(u_3, \dots, u_n) \in (X_3, \dots, X_n)(\Omega)} \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i = u_i\} \right), \quad (u_1, u_2) \in (X_1, X_2)(\Omega).$$

On définit de la même manière les lois d'autres vecteurs de *var*.

**Fonction de répartition :**

$$F(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq x_i\} \right), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

**Fonction génératrice :** Si  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega) \subseteq \mathbb{N}^n$ ,

$$G(s_1, \dots, s_n) = \mathbb{E} \left( \prod_{i=1}^n s_i^{X_i} \right), \quad (s_1, \dots, s_n) \in [-1, 1]^n.$$

**Indépendance de  $n$  *var* discrètes :**  $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Leftrightarrow$  pour tout  $(u_1, \dots, u_n) \in \prod_{i=1}^n X_i(\Omega)$  et tout  $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ ,

$$\mathbb{P} \left( \bigcap_{i \in I} \{X_i = u_i\} \right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(X_i = u_i).$$

**Sur l'indépendance :**

- Si  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$  n'est pas un ensemble produit, alors  $X_1, \dots, X_n$  ne sont pas indépendantes.
- $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i \in \mathcal{D}_i\} \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in \mathcal{D}_i)$ .
- $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$  indépendantes.
- $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow g(X_1, \dots, X_q)$  et  $h(X_{q+1}, \dots, X_n)$  indépendantes.

**Formule du transfert :**

$$\mathbb{E}(g(X_1, \dots, X_n)) = \sum_{(u_1, \dots, u_n) \in (X_1, \dots, X_n)(\Omega)} \dots \sum_{(u_1, \dots, u_n) \in (X_1, \dots, X_n)(\Omega)} g(u_1, \dots, u_n) \mathbb{P} \left( \bigcap_{i=1}^n \{X_i = u_i\} \right).$$

**Espérance et indépendance :**  $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow$

$$\mathbb{E} \left( \prod_{i=1}^n g_i(X_i) \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(g_i(X_i)).$$

**Loi d'une somme de  $n$  var indépendantes :**

$X_i \sim$	$\mathcal{B}(p)$	$\mathcal{B}(m_i, p)$	$\mathcal{P}(\lambda_i)$	$\mathcal{G}(p)$
$\sum_{i=1}^n X_i \sim$	$\mathcal{B}(n, p)$	$\mathcal{B} \left( \sum_{i=1}^n m_i, p \right)$	$\mathcal{P} \left( \sum_{i=1}^n \lambda_i \right)$	$\mathcal{G}(n, p)$

**Matrice de covariance :**

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathbb{V}(X_1) & \mathbb{C}(X_1, X_2) & \dots & \dots & \mathbb{C}(X_1, X_n) \\ \mathbb{C}(X_2, X_1) & \mathbb{V}(X_2) & \dots & \dots & \mathbb{C}(X_2, X_n) \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \mathbb{C}(X_{n-1}, X_n) \\ \mathbb{C}(X_n, X_1) & \dots & \dots & \dots & \mathbb{V}(X_n) \end{pmatrix}.$$

**Bilinéarité de la covariance :**

$$\mathbb{C} \left( \sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^q b_j Y_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^q a_i b_j \mathbb{C}(X_i, Y_j).$$

**Espérance et variance d'une somme de  $n$  var :**

$$\mathbb{E} \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i), \quad \mathbb{V} \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) + 2 \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} \mathbb{C}(X_i, X_j).$$

$X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow$

$$\mathbb{V} \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i).$$

**Paramètres d'un vecteur de *var* :** Les principaux paramètres d'un vecteur (colonne) de *var*

$X = (X_1, \dots, X_n)^t$  sont son espérance :  $\mathbb{E}_n(X) = (\mathbb{E}(X_1), \dots, \mathbb{E}(X_n))^t$ , et sa matrice de covariance  $\Sigma$ .

## 10 Convergences de suites de *var* discrètes

**Suite de *var* indépendantes :**  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite de *var* discrètes indépendantes  $\Leftrightarrow$  toute sous-famille finie extraite de  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une famille de *var* discrètes indépendantes.

**Convergence en probabilité :** Une suite de *var* discrètes  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en probabilité vers  $X$   $\Leftrightarrow$  pour tout  $\epsilon > 0$ , on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0.$$

**Loi faible des grands nombres :** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de *var iid* discrètes admettant un moment d'ordre 2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Alors  $(\bar{X}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en probabilité vers  $\mathbb{E}(X_1)$ .

**Convergence en loi :** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de *var* discrètes.

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en loi vers  $X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(X = k)$  pour tout  $k \in X(\Omega) \Leftrightarrow$

pour toute fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue bornée, on a  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(g(X_n)) = \mathbb{E}(g(X)) \Leftrightarrow$

$\lim_{n \rightarrow \infty} G_{X_n}(s) = G_X(s)$ ,  $s \in [-1, 1]$ .

**Hiérarchie :**

- Convergence en probabilité vers  $X \Rightarrow$  convergence en loi vers  $X$ .
- Convergence en probabilité vers 0  $\Leftrightarrow$  convergence en loi vers 0.

**Approximations usuelles :**

- Si  $p = \frac{l}{l+m}$  et  $n \leq \frac{l+m}{10}$ , alors

$$\mathcal{H}(l, m, n) \approx \mathcal{B}(n, p),$$

- Si  $n \geq 31$  et  $np \leq 10$ , alors

$$\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{P}(np).$$

## 11 Calcul intégral

**Primitive :** On appelle primitive de  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  toute fonction  $F$  telle que

$$F'(x) = f(x).$$

**Propriétés :**

- Pour tout  $c \in \mathbb{R}$ ,  $F + c$  est une primitive de  $f$ .
- Soient  $F$  une primitive de  $f$  et  $G$  une primitive de  $g$ . Alors, pour tout  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\lambda F + \mu G$  est une primitive de  $\lambda f + \mu g$ .

**Primitives usuelles :**

$f(x)$	$x^\alpha$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$\frac{1}{x}$	$e^{\alpha x}$	$\ln(x)$
$F(x)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$2\sqrt{x}$	$\ln( x )$	$\frac{e^{\alpha x}}{\alpha}$	$x \ln(x) - x$
$f(x)$	$a^x$	$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\tan^2(x) + 1$	$\frac{1}{\sin^2(x)}$
$F(x)$	$\frac{a^x}{\ln(a)}$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\tan(x)$	$-\cotan(x)$
$f(x)$	$\tan(x)$	$\cotan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$F(x)$	$-\ln( \cos(x) )$	$\ln( \sin(x) )$	$\arctan(x)$	$\arcsin(x)$	$\arccos(x)$

**Primitive d'une fonction composée :** Soit  $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable dont la dérivée est continue. Alors une primitive de  $g(x) = u'(x)f(u(x))$  est

$$G(x) = F(u(x)).$$

**Exemples de primitives de fonctions composées :**

$f(x)$	$\alpha u'(x)(u(x))^{\alpha-1}$	$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$u'(x)e^{u(x)}$
$F(x)$	$(u(x))^\alpha$	$2\sqrt{u(x)}$	$\ln( u(x) )$	$e^{u(x)}$
$f(x)$	$u'(x) \sin(u(x))$	$u'(x) \cos(u(x))$	$\frac{u'(x)}{\sqrt{1-(u(x))^2}}$	$\frac{u'(x)}{1+(u(x))^2}$
$F(x)$	$-\cos(u(x))$	$\sin(u(x))$	$\arcsin(u(x))$	$\arctan(u(x))$

**Calcul intégral et primitive d'une fonction  $f$  continue :**

- On appelle intégrale de  $f$  sur  $[a, b]$  le réel

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

- On adopte la notation "crochet" :  $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ , donc

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

**Propriétés :**

- $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$
- $\int_a^a f(x)dx = 0.$
- Linéarité de l'intégration :

$$\int_a^b (\lambda f(x) + g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

- Relation de Chasles : pour tout  $c \in ]a, b[$ , on a

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

**Techniques de calcul intégral :** Soient  $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  et  $v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions dérivables dont les dérivées sont continues.

- Intégration par parties :

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx.$$

- Changement de variable :

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{u^{-1}(a)}^{u^{-1}(b)} f(u(y))u'(y)dy.$$

On dit alors que l'on a fait le changement de variable :  $x = u(y)$  (ou  $y = u^{-1}(x)$ ). Ainsi, on remplace  $x$  par  $u(y)$ , donc  $dx = d(u(y)) = u'(y)dy$  et on ajuste les bornes d'intégration :  $x = a \Leftrightarrow y = u^{-1}(a)$  et  $x = b \Leftrightarrow y = u^{-1}(b)$ .

**Propriétés :** Soit  $f$  une fonction positive. Alors

- pour tous  $a \leq b$ , on a  $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ .
- pour tout  $[c, d] \subseteq [a, b]$ , on a  $\int_c^d f(x)dx \leq \int_a^b f(x)dx$ .

**Intégrale nulle :** Si  $f$  est continue et de signe constant sur  $[a, b]$ , alors

$$\int_a^b f(x)dx = 0 \text{ si, et seulement si, } f(x) = 0, \text{ pour tout } x \in [a, b].$$

**Majoration de l'intégrale :**

- pour tous  $a \leq b$ , on a  $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx \leq (b-a) \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$ .
- Inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b (f(x))^2 dx} \sqrt{\int_a^b (g(x))^2 dx}.$$

**Intégrale sur un intervalle centré en 0 :**

- Si  $f$  est paire sur  $[-a, a]$ , i.e.  $f(-x) = f(x)$  pour tout  $x \in [-a, a]$ , alors on a

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx.$$

- Si  $f$  est impaire  $[-a, a]$ , i.e.  $f(-x) = -f(x)$  pour tout  $x \in [-a, a]$ , alors (si existence) on a

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0.$$

**Intégrale généralisée en  $-\infty$  ou/et  $\infty$  :**

- $\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \int_a^\ell f(x)dx,$
- $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{\ell \rightarrow -\infty} \int_\ell^b f(x)dx,$
- pour tout  $c \in \mathbb{R}$ , on a  $\int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^\infty f(x)dx.$

**Intégrales de Riemann :**

- L'intégrale  $I(\alpha) = \int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx$  existe si, et seulement si,  $\alpha > 1.$
- L'intégrale  $J(\beta) = \int_0^1 \frac{1}{x^\beta} dx$  existe si, et seulement si,  $\beta < 1.$

**Extension :**

Les principaux résultats présentés dans ce chapitre s'étendent aux fonctions continues par morceaux avec des primitives par morceaux, *i.e.*  $F$  est dérivable sur  $[a, b]$  sauf, éventuellement, en un nombre fini de points et on a  $F'(x) = f(x)$  sauf, éventuellement, en un nombre fini de points.

**Quelques règles de calculs pour les intégrales doubles :**

- Les intégrales doubles vérifient les mêmes propriétés que les intégrales simples (linéarité, relation de Chasles...),
- La plupart du temps, le calcul des intégrales doubles consiste à exprimer ces intégrales en une série d'intégrales simples calculables.
- Lorsque toutes les fonctions mises en jeu sont intégrables, si le domaine d'intégration est défini en adéquation, l'ordre des intégrations n'a pas d'importance.

En outre :  $\int_{-\infty}^\infty \left( \int_{-\infty}^\infty f(x, y) dx \right) dy = \int_{-\infty}^\infty \left( \int_{-\infty}^\infty f(x, y) dy \right) dx.$

En intégrant sur  $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq y \leq 1\}$ , on a

$$\int_0^1 \left( \int_0^y f(x, y) dx \right) dy = \int_0^1 \left( \int_x^1 f(x, y) dy \right) dx.$$

- *Changement de variable en coordonnées polaires* : en faisant le changement de variable :  $(x, y) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ , avec  $(r, \theta) \in ]0, \infty[ \times ]0, 2\pi]$ , on a

$$\int \int_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy = \int \int_{\mathcal{D}^*} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r dr d\theta,$$

où  $\mathcal{D}$  désigne un domaine défini en fonction de  $(x, y)$  et  $\mathcal{D}^*$  son analogue avec  $(r, \theta)$ .



## 12 Variables aléatoires réelles à densité

**Densité :** On appelle densité toute fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) \geq 0$ ,
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ .

**Var à densité :** On dit qu'une var  $X$  est à densité s'il existe une densité  $f$  telle que, pour tous  $a \leq b$ ,

on a

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

On dit alors que  $X$  est de densité  $f$  ou  $X$  possède la densité  $f$  ou  $f$  est une densité de  $X$ . La loi de  $X$  est caractérisée par  $f$ .

**Non-unicité de la densité d'une var :** Si  $X$  possède la densité  $f$ , alors elle possède d'autres densités. En effet, si  $g$  est une fonction égale à  $f$  sauf en quelques points alors  $g$  est aussi une densité de  $X$ .

**Calculs usuels :**

$\mathbb{P}(X = a)$	$\mathbb{P}(X \leq b)$	$\mathbb{P}(X \geq a)$	$\mathbb{P}(a \leq X \leq b)$
0	$\int_{-\infty}^b f(x)dx$	$\int_a^{\infty} f(x)dx$	$\int_{-\infty}^b f(x)dx - \int_{-\infty}^a f(x)dx$

Ainsi, pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , on a  $\mathbb{P}(X = a) = 0$  (en cela, le comportement d'une var à densité diffère radicalement de celui d'une var discrète). On peut donc remplacer les inégalités larges par des inégalités strictes :  $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b) \dots$

**Fonction de répartition :**

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

La fonction de répartition caractérise la loi de  $X$  ; pour tous  $a \leq b$ , on a

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a).$$

**Support :** Soit  $F$  la fonction de répartition d'une var  $X$  de densité  $f$ . Alors  $X(\Omega)$  est l'adhérence de  $\{x \in \mathbb{R}; F(x) \in ]0, 1[ \}$ .

Si  $\{x \in \mathbb{R}; f(x) \neq 0\}$  est un intervalle ou  $\mathbb{R}$  (ce qui est souvent le cas), alors  $X(\Omega)$  est aussi l'adhérence de  $\{x \in \mathbb{R}; f(x) \neq 0\}$ .

**Exemples :**

Loi	uniforme	exponentielle	gamma	normale
paramètres	$(a, b) \in \mathbb{R}^2, a < b$	$\lambda > 0$	$m > 0, \lambda > 0$	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$
$X \sim$	$\mathcal{U}([a, b])$	$\mathcal{E}(\lambda)$	$\Gamma(m, \lambda)$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
$X(\Omega)$	$[a, b]$	$[0, \infty[$	$[0, \infty[$	$\mathbb{R}$
$f(x)$	$\frac{1}{b-a}$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{\lambda^m}{\Gamma(m)} x^{m-1} e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

**Propriétés :**

- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $F(x) \in [0, 1]$ ,
- $F$  est continue sur  $\mathbb{R}$ ,
- $F$  est croissante,
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$ .

**Densité et fonction de répartition :** Soit  $X$  une var à densité de fonction de répartition  $F$ . Alors une densité  $f$  de  $X$  est donnée par

$$f(x) = F'(x)$$

pour tout  $x \in X(\Omega)$  sauf les points où  $F$  n'est pas dérivable, et par ce qu'on veut ailleurs (du moment que  $f$  reste une densité).

**Égalité en loi :**  $X$  et  $Y$  suivent la même loi  $\Leftrightarrow F_X(x) = F_Y(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f_X(x) = f_Y(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  sauf, éventuellement, en un nombre fini de points.

**Var symétrique :**  $X$  est symétrique  $\Leftrightarrow X$  et  $-X$  suivent la même loi.

$X$  possède une densité  $f$  paire  $\Rightarrow X$  est symétrique.

*Exemple :* une var  $X$  suivant la loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ , i.e. de densité :  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , est symétrique car  $f$  est paire.

**Propriétés :**  $X$  symétrique  $\Rightarrow \mathbb{P}(X \leq -x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\mathbb{P}(X \leq x) - 1, \quad x \geq 0.$$

**Espérance :**

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

**Formule du transfert :**

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx.$$

**Propriétés :**

- $\mathbb{E}(a) = a$ ,
- $X(\Omega) \subseteq [0, \infty[ \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq 0$ ,
- $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ ,
- $\mathbb{E}(aX^2 + bX + c) = a\mathbb{E}(X^2) + b\mathbb{E}(X) + c$ .

**Moment d'ordre  $p$  :**

$$m_p = \mathbb{E}(X^p) = \int_{-\infty}^{\infty} x^p f(x) dx.$$

**Méthode de la fonction muette :** Si, pour toute fonction continue bornée  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , on a

$$\mathbb{E}(g(X)) = \mathbb{E}(g(Y)), \text{ alors } X \text{ et } Y \text{ suivent la même loi.}$$

**Espérance et var symétrique :**  $X$  est symétrique  $\Rightarrow$  pour toute fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  impaire (si existence)  $\mathbb{E}(g(X)) = 0$ .

**Variance :**

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

**Propriétés :**

- $\mathbb{V}(X) \geq 0$ ,
- $\mathbb{V}(X) = 0 \Leftrightarrow X$  est une *var* constante,
- $\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X)$ .

**Formule de König-Huyghens :**

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

**Écart-type :**

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

**Exemples :**

$X \sim$	$\mathcal{U}([a, b])$	$\mathcal{E}(\lambda)$	$\Gamma(m, \lambda)$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
$\mathbb{E}(X)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{m}{\lambda}$	$\mu$
$\mathbb{V}(X)$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{m}{\lambda^2}$	$\sigma^2$
$\sigma(X)$	$\frac{b-a}{2\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\sqrt{m}}{\lambda}$	$\sigma$

**Inégalité de Markov :** Soit  $h : \mathbb{R} \rightarrow ]0, \infty[$  une fonction croissante. Pour tout  $\epsilon > 0$ , on a

$$\mathbb{P}(|X| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(h(|X|))}{h(\epsilon)}.$$

**Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :** Pour tout  $\epsilon > 0$ , on a

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\epsilon^2}.$$

**Transformée de Laplace :**

$$L(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Transformée de Laplace et ses dérivées :**

$$L'(t) = \mathbb{E}(Xe^{tX}), \quad L''(t) = \mathbb{E}(X^2e^{tX}), \quad L^{(k)}(t) = \mathbb{E}(X^k e^{tX}).$$

**Propriétés :**

$$\mathbb{E}(X) = L'(0), \quad \mathbb{V}(X) = L''(0) - (L'(0))^2.$$

**Transformée de Laplace et égalité en loi :**  $X$  et  $Y$  suivent la même loi  $\Leftrightarrow L_X(t) = L_Y(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

**Fonction caractéristique :**

$$\varphi(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Exemples :**

$X \sim$	$\mathcal{U}([a, b])$	$\mathcal{E}(\lambda)$	$\Gamma(m, \lambda)$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
$\varphi(t)$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$	$\frac{\lambda^m}{(\lambda - it)^m}$	$e^{it\mu - \sigma^2 \frac{t^2}{2}}$

**Fonction caractéristique et densité :**

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-itx} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Fonction caractéristique et ses dérivées :**

$$\varphi'(t) = \mathbb{E}((iX)e^{itX}), \quad \varphi''(t) = -\mathbb{E}(X^2 e^{itX}), \quad \varphi^{(k)}(t) = \mathbb{E}((iX)^k e^{itX}).$$

**Fonction caractéristique et égalité en loi :**  $X$  et  $Y$  suivent la même loi  $\Leftrightarrow \varphi_X(t) = \varphi_Y(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

### 13 Lois à densité usuelles

**Loi uniforme (continue)** :  $X$  suit la loi uniforme  $\mathcal{U}([a, b])$ ,  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,  $a < b \Leftrightarrow X(\Omega) = [a, b]$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

**Loi triangulaire (continue)** :  $X$  suit la loi triangulaire  $\mathcal{T}_{riang}(a)$ ,  $a > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = [-a, a]$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}(a-|x|) & \text{si } x \in [-a, a], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = 0, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{a^2}{6}.$$

**Loi parabolique** :  $X$  suit la loi parabolique  $\mathcal{P}_{arabol}(a)$ ,  $a > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = [-a, a]$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4a^3}(a^2-x^2) & \text{si } x \in [-a, a], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = 0, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{a^2}{5}.$$

**Loi bêta :**  $X$  suit la loi bêta  $B(r, s)$ ,  $(r, s) \in ]0, \infty[^2 \Leftrightarrow X(\Omega) = [0, 1]$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta(r, s)} x^{r-1} (1-x)^{s-1} & \text{si } x \in [0, 1], \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où  $\beta(r, s) = \int_0^1 t^{r-1} (1-t)^{s-1} dt$ .

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{r+s}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{rs}{(r+s)^2(r+s+1)}.$$

**Loi de Laplace :**  $X$  suit la loi de Laplace  $\mathcal{L}(a)$ ,  $a > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{1}{2a} e^{-\frac{|x|}{a}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = 0, \quad \mathbb{V}(X) = 2a^2.$$

**Loi exponentielle :**  $X$  suit la loi exponentielle  $\mathcal{E}(\lambda)$ ,  $\lambda > 0 \Leftrightarrow$

$$X(\Omega) = [0, \infty[,$$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

**Loi gamma :**  $X$  suit la loi gamma  $\Gamma(m, \lambda)$ ,  $(m, \lambda) \in ]0, \infty[^2 \Leftrightarrow X(\Omega) = [0, \infty[,$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^m}{\Gamma(m)} x^{m-1} e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où  $\Gamma(m) = \int_0^\infty t^{m-1} e^{-t} dt$  (on a  $\Gamma(m) = (m-1)!$  si  $m \in \mathbb{N}^*$ ).

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{m}{\lambda}, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{m}{\lambda^2}.$$

**Loi de Cauchy :**  $X$  suit la loi de Cauchy  $\mathcal{C}(\mu, \lambda)$ ,  $\mu \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{\lambda}{\pi(\lambda^2 + (x - \mu)^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Espérance et variance : elles n'existent pas.

**Loi de Pareto :**  $X$  suit la loi de Pareto  $\mathcal{P}_{ar}(a, \gamma, x_0)$ ,  $(a, \gamma) \in ]0, \infty[^2$ ,  $x_0 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow X(\Omega) = [a + x_0, \infty[$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\gamma}{a} \left( \frac{a}{x - x_0} \right)^{\gamma+1} & \text{si } x > a + x_0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\gamma a}{\gamma - 1} + x_0 \text{ si } \gamma > 1, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{\gamma a^2}{(\gamma - 1)^2(\gamma - 2)} \text{ si } \gamma > 2.$$

**Loi normale :**  $X$  suit la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \mu, \quad \mathbb{V}(X) = \sigma^2.$$

Lorsque  $\mu = 0$  et  $\sigma = 1$ , on dit que  $X$  suit la loi normale "centrée réduite".

**Loi du Chi-deux :**  $X$  suit la loi du Chi-deux  $\chi^2(\nu)$ ,  $\nu > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = [0, \infty[$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma(\frac{\nu}{2})} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

$$\text{où } \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) = \int_0^\infty t^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-t} dt.$$



Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \nu, \quad \mathbb{V}(X) = 2\nu.$$

**Loi de Student :**  $X$  suit la loi de Student  $\mathcal{T}(\nu)$ ,  $\nu > 0 \Leftrightarrow X(\Omega) = \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

où, pour tout  $\alpha \in \{\frac{\nu}{2}, \frac{\nu+1}{2}\}$ , on a  $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ .

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = 0, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{\nu}{\nu-2} \text{ si } \nu > 2.$$

**Loi de Fisher :**  $X$  suit la loi de Fisher  $\mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ ,  $(\nu_1, \nu_2) \in ]0, \infty[^2$  :

$X(\Omega) = [0, \infty[$ ,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2})} x \left(\frac{\nu_1 x}{\nu_1 x + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} \left(1 - \frac{\nu_1 x}{\nu_1 x + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_2}{2}} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où  $\beta(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2}) = \int_0^1 t^{\frac{\nu_1}{2}-1} (1-t)^{\frac{\nu_2}{2}-1} dt$ .

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2} \text{ si } \nu_2 > 2, \quad \mathbb{V}(X) = \frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)} \text{ si } \nu_2 > 4.$$

## 14 Retour sur la loi normale

**Loi normale :** *Rappel :* La var  $X$  suit la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$ , si elle possède la densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$


La loi normale est particulièrement intéressante car

- elle modélise correctement de nombreuses mesures physiques pouvant prendre une infinité de valeurs (avec les décimales) : poids, tailles, durées, vitesses...
- elle est une loi limite universelle. Cela découle du théorème central limite présenté plus loin.

**Grphe :** Le graphe de  $f$  est symétrique par rapport à  $\mu$ . Celui-ci est en forme de "cloche" plus ou moins arrondie selon les valeurs de  $\sigma$ . Ce graphe a

- un point maximum de coordonnées :  $(x_*, y_*) = (\mu, f(\mu)) = \left(\mu, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)$ ,
- deux points d'inflexion de coordonnées
 
$$(x_0, y_0) = (\mu - \sigma, f(\mu - \sigma)) = \left(\mu - \sigma, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}}\right)$$
 et
 
$$(x_1, y_1) = (\mu + \sigma, f(\mu + \sigma)) = \left(\mu + \sigma, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}}\right).$$

Exemples de densités : loi normale



**Espérance, variance et écart-type :**  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow$

$$\mathbb{E}(X) = \mu, \quad \mathbb{V}(X) = \sigma^2, \quad \sigma(X) = \sigma.$$

Ainsi,  $\mu$  est la valeur moyenne de  $X$  et  $\sigma$  mesure la dispersion des valeurs de  $X$  autour de  $\mu$ .

**Loi normale centrée réduite :** La *var*  $X$  suit la loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$  si elle possède la densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a  $\mathbb{E}(X) = 0$ , d'où le "centrée", et  $\mathbb{V}(X) = 1$ , d'où le "réduite".

Comme une densité de  $X$  est paire,  $X$  est symétrique. Cela implique :

- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $\mathbb{P}(-X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ ,
- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $\mathbb{P}(X \leq -x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x)$ ,
- pour tout  $x \geq 0$ , on a  $\mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\mathbb{P}(X \leq x) - 1$ ,
- pour toute fonction impaire  $g$  (si existence) on a  $\mathbb{E}(g(X)) = 0$ .

**Propriétés :**  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow$

- $X + b \sim \mathcal{N}(\mu + b, \sigma^2)$ ,  $aX \sim \mathcal{N}(a\mu, a^2\sigma^2)$  et  $aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ ,
- on a

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Ainsi, la transformation opérée par  $Z$  a centrée et réduite la *var*  $X$ . Cette transformation est souvent utilisée en pratique.

**Règle des 4 $\sigma$  :**  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow$

$$\mathbb{P}(\mu - 4\sigma \leq X \leq \mu + 4\sigma) \simeq 1.$$

Ainsi, la plupart des réalisations d'une *var*  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  sont contenues dans l'intervalle  $[\mu - 4\sigma, \mu + 4\sigma]$ .

**Moments :**  $X \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on a

$$\mathbb{E}(X^{2k}) = \prod_{i=1}^k (2i - 1), \quad \mathbb{E}(X^{2k+1}) = 0.$$

**Table de valeurs et loi normale centrée réduite :**  $X \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow$  la fonction de la répartition de  $X$  est

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a  $F(x) = F(y) \Leftrightarrow x = y$ , et  $f(x) = F'(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

La fonction  $F$  ne peut pas s'écrire sous une forme analytique, sans intégrale. C'est pourquoi on utilise une table de valeurs associée donnant  $F(x)$  avec  $x \in [0; 3,99]$  et  $x = x_1 + x_2$  (voir la table  $\mathcal{N}(0, 1)$  page 71).

**Approximation : loi binomiale et loi normale :** Si  $n \geq 31$ ,  $np \geq 5$  et  $n(1 - p) \geq 5$ , alors on a  $\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1 - p))$ .

En outre, avec  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$  et  $Y \sim \mathcal{N}(np, np(1 - p))$  et une correction de continuité,

◦ pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on a  $\mathbb{P}(X \leq k) \simeq \mathbb{P}(Y \leq k + 0,5)$ ,  $\mathbb{P}(X \geq k) \simeq \mathbb{P}(Y \geq k - 0,5)$  et

$$\mathbb{P}(X = k) \simeq \mathbb{P}(k - 0,5 \leq Y \leq k + 0,5),$$

◦ pour tout  $(k_1, k_2) \in \mathbb{N}^2$  tel que  $k_1 < k_2$ , on a

$$\mathbb{P}(k_1 \leq X \leq k_2) \simeq \mathbb{P}(k_1 - 0,5 \leq Y \leq k_2 + 0,5).$$

**Approximation : loi de Poisson et la loi normale :** Si  $\lambda \geq 15$ , alors on a  $\mathcal{P}(\lambda) \approx \mathcal{N}(\lambda, \lambda)$ .

## 15 Couples de *var* à densité

**Densité (bidimensionnelle) :** On appelle densité (bidimensionnelle) toute fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

- pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y) \geq 0$ ,
- $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$ .

**Couple de *var* à densité :** On dit qu'un couple de *var*  $(X, Y)$  est à densité s'il existe une densité  $f$  telle que, pour tout  $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$ , on a

$$\mathbb{P}((X, Y) \in \mathcal{D}) = \int \int_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy,$$

( $x$  est associé à  $X$  et  $y$  est associé à  $Y$ ).

On dit alors que  $(X, Y)$  est de densité  $f$  ou  $(X, Y)$  possède la densité  $f$  ou  $f$  est une densité de  $(X, Y)$ . La loi de  $(X, Y)$  est caractérisée par  $f$ .

**Propriétés :** Pour tous  $a \leq b$ ,  $c \leq d$  et toutes fonctions

- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $g(x) \leq h(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , on a
- $\mathbb{P}(\{a \leq X \leq b\} \cap \{c \leq Y \leq d\}) = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy$ ,
  - $\mathbb{P}(\{a \leq X \leq b\} \cap \{g(X) \leq Y \leq h(X)\}) = \int_a^b \left( \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx$ ,
  - $\mathbb{P}(g(X) \leq Y \leq h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx$ .

**Fonction de répartition :**

$$F(x, y) = \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

On a  $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , et  $F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y)$ ,  $y \in \mathbb{R}$ .

**Support :** Soit  $F$  la fonction de répartition d'un couple de *var*  $(X, Y)$  de densité  $f$ . Alors  $(X, Y)(\Omega)$  est l'adhérence de  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; F(x, y) \in ]0, 1[ \}$ .

Si  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; f(x, y) \neq 0\}$  est un ensemble d'aire non nulle "sans points ou courbes isolés" (*ce qui est souvent le cas*), alors  $(X, Y)(\Omega)$  est aussi l'adhérence de  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; f(x, y) \neq 0\}$ . De plus,  $X(\Omega)$  est l'adhérence de l'ensemble des  $x$  vérifiant  $f(x, y) \neq 0$  pour tout  $y \in \mathbb{R}$ , et  $Y(\Omega)$  est l'adhérence de l'ensemble des  $y$  vérifiant  $f(x, y) \neq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Densité et fonction de répartition :** Soit  $(X, Y)$  un couple de *var* à densité de fonction de répartition  $F$ . Alors une densité  $f$  de  $(X, Y)$  est donnée par

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y)$$

pour tout  $(x, y) \in (X, Y)(\Omega)$  sauf les points où  $F$  n'est pas différentiable, et par ce qu'on veut ailleurs (du moment que  $f$  reste une densité).

**Densités marginales :**

◦ Une densité de  $X$  est

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, \quad x \in \mathbb{R}.$$

◦ Une densité de  $Y$  est

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx, \quad y \in \mathbb{R}.$$

◦ Si  $f(x, y) = f(y, x)$  pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  sauf, éventuellement, sur un ensemble d'aire nulle, alors  $X$  et  $Y$  suivent la même loi ; une densité de  $Y$  est  $f_Y(y) = f_X(y)$ ,  $y \in \mathbb{R}$ .

**Indépendance :**  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Leftrightarrow (X, Y)$  possède la densité produit :  $f_X(x)f_Y(y)$ , *i.e.*  $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$  pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  sauf, éventuellement, sur un ensemble d'aire nulle (impliquant  $(X, Y)(\Omega) = X(\Omega) \times Y(\Omega)$ )  $\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$  pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$   $\Leftrightarrow$  pour tous  $a \leq b, c \leq d$ ,

$$\mathbb{P}(\{a \leq X \leq b\} \cap \{c \leq Y \leq d\}) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b)\mathbb{P}(c \leq Y \leq d).$$

**Sur l'indépendance :**

◦ Si  $(X, Y)(\Omega)$  n'est pas un ensemble produit, *i.e.* on ne peut pas écrire  $(X, Y)(\Omega) = I \times J$  avec  $(I, J) \subseteq \mathbb{R}^2$ , alors  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.

- S'il existe deux fonctions  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$f(x, y) = g(x)h(y), \quad \int_{-\infty}^{\infty} g(x)dx = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} h(y)dy = 1,$$

alors  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, une densité de  $X$  est  $g$  et une densité de  $Y$  est  $h$ .

- $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow \mathbb{P}(\{X \in \mathcal{D}_1\} \cap \{Y \in \mathcal{D}_2\}) = \mathbb{P}(X \in \mathcal{D}_1)\mathbb{P}(Y \in \mathcal{D}_2)$ .
- $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow g(X)$  et  $h(Y)$  indépendantes.

**"Indépendantes et identiquement distribuées"/iid :** On dit que  $X$  et  $Y$  sont *iid* quand elles sont "indépendantes et identiquement distribuées". La mention "identiquement distribuées" signifie "suivent la même loi".

**Loi d'un couple de *var* ( $\phi(X, Y), \psi(X, Y)$ ) :**

(*théorème du changement de variable*) Soient  $(X, Y)$  un couple de *var* de densité  $f_{(X,Y)}$ , et  $\phi : (X, Y)(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\psi : (X, Y)(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions. On considère le couple de *var* :

$$(U, V) = (\phi(X, Y), \psi(X, Y)).$$

On suppose que  $g(x, y) = (\phi(x, y), \psi(x, y))$  est injective et qu'il existe deux fonctions  $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow X(\Omega)$  et  $k : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y(\Omega)$  différentiables telles que

$$\begin{cases} u = \phi(x, y), \\ v = \psi(x, y), \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = h(u, v), \\ y = k(u, v). \end{cases}$$

Soit  $J(u, v)$  le jacobien associé à  $(x, y) = (h(u, v), k(u, v))$  défini par le déterminant :

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial h}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial h}{\partial v}(u, v) \\ \frac{\partial k}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial k}{\partial v}(u, v) \end{vmatrix} = \frac{\partial h}{\partial u}(u, v) \frac{\partial k}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial k}{\partial u}(u, v) \frac{\partial h}{\partial v}(u, v).$$

Alors une densité de  $(U, V)$  est donnée par

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(h(u, v), k(u, v))|J(u, v)|, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

**Densité d'une somme de deux *var* indépendantes :** (*produit de convolution*)

$$f_{X+Y}(x) = (f_X * f_Y)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u) f_Y(x-u) du, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a aussi  $f_{X+Y}(x) = (f_Y * f_X)(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

**Exemples :**

$X_i \sim$	$\mathcal{E}(\lambda)$	$\Gamma(m_i, \lambda)$	$\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$	$\chi^2(\nu_i)$
$X_1 + X_2 \sim$	$\Gamma(2, \lambda)$	$\Gamma(m_1 + m_2, \lambda)$	$\mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$	$\chi^2(\nu_1 + \nu_2)$

En particulier, toute *var* définie comme une combinaison linéaire de 2 *var* indépendantes suivant chacune une loi normale suit une loi normale.

**Densité du produit de deux *var* indépendantes :**

$$f_{XY}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(u) f_X\left(\frac{x}{u}\right) \frac{1}{|u|} du, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Densité du quotient de deux *var* indépendantes :**

$$f_{\frac{X}{Y}}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u) f_Y\left(\frac{u}{x}\right) du, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Caractérisations de quelques lois connues :**

- Loi du Chi-deux :  $X$  et  $Y$  *iid* avec  $X \sim \mathcal{N}(0, 1) \Rightarrow$

$$X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2).$$

- Loi de Student :  $X$  et  $Y$  indépendantes avec  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et  $Y \sim \chi^2(\nu) \Rightarrow$

$$\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{\nu}}} = \sqrt{\nu} \frac{X}{\sqrt{Y}} \sim \mathcal{T}(\nu).$$



◦ Loi de Fisher :  $X$  et  $Y$  indépendantes avec  $X \sim \chi^2(\nu_1)$  et  $Y \sim \chi^2(\nu_2) \Rightarrow$

$$\frac{\frac{X}{\nu_1}}{\frac{Y}{\nu_2}} = \frac{\nu_2 X}{\nu_1 Y} \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2).$$

**Formule du transfert :**

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

**Méthode de la fonction muette :** Si, pour toute fonction continue bornée  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , on a

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \mathbb{E}(g(U, V)), \text{ alors } (X, Y) \text{ et } (U, V) \text{ suivent la même loi.}$$

**Linéarité de l'espérance :**

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y).$$

**Inégalité de Cauchy-Schwarz :**

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} \sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}.$$

**Moments et indépendance :**  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow$

$$\mathbb{E}(g(X)h(Y)) = \mathbb{E}(g(X))\mathbb{E}(h(Y)).$$

En particulier, on a  $\mathbb{E}(X^k Y^m) = \mathbb{E}(X^k)\mathbb{E}(Y^m)$ .

**Covariance :**

$$\mathbb{C}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

**Matrice de covariance :**

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathbb{V}(X) & \mathbb{C}(X, Y) \\ \mathbb{C}(Y, X) & \mathbb{V}(Y) \end{pmatrix}.$$

**Variance d'une somme de *var* :**

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\mathbb{C}(X, Y).$$

**Propriétés :**

- $\mathbb{C}(X, Y) = \mathbb{C}(Y, X)$ ,
- $\mathbb{C}(X, a) = 0$ ,
- $\mathbb{C}(aX + b, cY + d) = ac\mathbb{C}(X, Y)$ ,
- $\mathbb{C}(aX + bY, cU + dV) = ac\mathbb{C}(X, U) + ad\mathbb{C}(X, V) + bc\mathbb{C}(Y, U) + bd\mathbb{C}(Y, V)$ ,
- $|\mathbb{C}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$ .

**Covariance, variance et indépendance :**  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Rightarrow$ 

- $\mathbb{C}(X, Y) = 0$ ,
  - $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ .
- $\mathbb{C}(X, Y) = 0 \Rightarrow$  on ne peut rien dire sur l'indépendance de  $X$  et  $Y$ .

**Coefficient de corrélation linéaire :**

$$\rho(X, Y) = \frac{\mathbb{C}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

On a  $\rho(X, Y) \in ]-1, 1[$ . Plus  $|\rho(X, Y)|$  est proche de 1, plus la liaison linéaire entre  $X$  et  $Y$  est forte.

**Paramètres d'un couple de *var* :** Les principaux paramètres d'un couple de *var* (vecteur colonne)

$U = (X, Y)^t$  sont son espérance :  $\mathbb{E}_2(U) = (\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y))^t$ , et sa matrice de covariance  $\Sigma$ .

**Propriétés :** Soient  $Z = (X, Y)^t$  un couple de *var* (vecteur colonne) d'espérance  $\mu = (\mu_1, \mu_2)^t$  et de

matrice de covariance  $\Sigma$ ,  $A$  une matrice à 2 colonnes et  $W = (U, V)^t$  un couple de *var* défini par

$W = AX$ . Alors

- l'espérance de  $U$  est  $\mu = A\mu$ ,
- la matrice de covariance de  $W$  est  $\Sigma_* = A\Sigma A^t$ .

**Couple aléatoire réel gaussien (*carg*) :**

◦  $(X, Y)^t$  est un *carg* (vecteur colonne)  $\Leftrightarrow$  pour tout  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , la *var*  $aX + bY$  suit une loi normale.

◦ Un *carg*  $(X, Y)^t$  est caractérisé par son espérance  $\mu$  et sa matrice de covariance  $\Sigma$ .

La loi de  $(X, Y)^t$  est notée  $\mathcal{N}_2(\mu, \Sigma)$ .

**Loi marginales d'un *carg* :** Si  $(X, Y)^t$  est un *carg*, alors  $X \sim \mathcal{N}(\mathbb{E}(X), \mathbb{V}(X))$  et  $Y \sim \mathcal{N}(\mathbb{E}(Y), \mathbb{V}(Y))$ .

**Carg et indépendance :** Si  $(X, Y)^t$  est un *carg* alors  $X$  et  $Y$  indépendantes  $\Leftrightarrow \mathbb{C}(X, Y) = 0$ .

**Densité et fonction caractéristique d'un *carg* :** Soit  $(X, Y)^t \sim \mathcal{N}_2(\mu, \Sigma)$  avec  $\mu = (\mu_1, \mu_2)^t$ .

- Si  $\det(\Sigma) > 0$ , alors  $(X, Y)^t$  possède la densité :

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu_1, y-\mu_2)\Sigma^{-1}(x-\mu_1, y-\mu_2)^t}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- La fonction caractéristique de  $(X, Y)^t$  est

$$\varphi(s, t) = e^{i(\mu_1, \mu_2)(s, t)^t - \frac{1}{2}(s, t)\Sigma(s, t)^t}, \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

**Cas particulier :** Soit  $(X, Y)^t \sim \mathcal{N}_2(\mu, \Sigma)$  avec  $\mu = (0, 0)^t = 0_2$  et  $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\rho \in ]-1, 1[$ . Alors

- $(X, Y)^t$  possède la densité :

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x^2+y^2-2\rho xy)}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

- la fonction caractéristique de  $(X, Y)^t$  est

$$\varphi(s, t) = e^{-\frac{1}{2}(s^2+t^2+2\rho st)}, \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

**Système linéaire et *carg* :** Soient  $Z = (X, Y)^t \sim \mathcal{N}_2(\mu, \Sigma)$  et  $W = (U, V)^t$  avec

$$\begin{cases} U = a_1X + b_1Y + c_1, \\ V = a_2X + b_2Y + c_2. \end{cases}$$

En posant  $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$  et  $c = (c_1, c_2)^t$ , on a

$$W = AZ + c \sim \mathcal{N}_2(A\mu + c, A\Sigma A^t).$$

## 16 Vecteurs de *var* à densité

**Densité (*n*-dimensionnelle) :** On appelle densité (*n*-dimensionnelle) toute fonction  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

- pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ ,
- $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$ .

**Vecteur de *var* à densité :** On dit qu'un vecteur de *var*  $(X_1, \dots, X_n)$  est à densité s'il existe une densité  $f$ , telle que, pour tout  $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ , on a

$$\mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{D}) = \int \dots \int_{\mathcal{D}} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

On dit alors que  $(X_1, \dots, X_n)$  est de densité  $f$  ou  $(X_1, \dots, X_n)$  possède la densité  $f$  ou  $f$  est une densité de  $(X_1, \dots, X_n)$ . La loi de  $(X_1, \dots, X_n)$  est caractérisée par  $f$ .

**Fonction de répartition :**

$$F(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq x_i\}\right), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

**Retour sur le support :** Soit  $F$  la fonction de répartition d'un vecteur de *var*  $(X_1, \dots, X_n)$  à densité.

On définit  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$  par l'adhérence de  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n; F(x_1, \dots, x_n) \in ]0, 1[ \}$ .

**Densités marginales :** Une densité de  $X_1$  est donnée par

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n, \quad x_1 \in \mathbb{R}.$$

On définit de la même manière des densités pour d'autres *var*  $X_2, \dots, X_n$ .

**Densité d'un vecteur de *var* composantes de  $(X_1, \dots, X_n)$  :** Une densité de  $(X_1, X_2)$  est donnée par

$$f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_3 \dots dx_n, \quad (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

On définit de la même manière des densités d'autres vecteurs de *var*.

**Indépendance de  $n$  var à densité :**  $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Leftrightarrow (X_1, \dots, X_n)$  possède la densité

produit :  $\prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$ , *i.e.*

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  sauf, éventuellement, sur un ensemble de volume nul (impliquant

$$(X_1, \dots, X_n)(\Omega) = X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \Leftrightarrow F(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$$

pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \Leftrightarrow$  pour tous  $a_i \leq b_i, i \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{a_i \leq X_i \leq b_i\}\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(a_i \leq X_i \leq b_i).$$

**Sur l'indépendance :**

- Si  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$  n'est pas un ensemble produit, alors  $X_1, \dots, X_n$  ne sont pas indépendantes.
- $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \in \mathcal{D}_i\}\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in \mathcal{D}_i)$ .
- $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$  indépendantes.
- $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow g(X_1, \dots, X_q)$  et  $h(X_{q+1}, \dots, X_n)$  indépendantes.

**Formule du transfert :**

$$\mathbb{E}(g(X_1, \dots, X_n)) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

**Espérance et indépendance :**  $X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow$

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n g_i(X_i)\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(g_i(X_i)).$$

**Quelques lois usuelles d'une somme de  $n$  var indépendantes :**

$X_i \sim$	$\mathcal{E}(\lambda)$	$\Gamma(m_i, \lambda)$	$\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$	$\chi^2(\nu_i)$
$\sum_{i=1}^n X_i \sim$	$\Gamma(n, \lambda)$	$\Gamma\left(\sum_{i=1}^n m_i, \lambda\right)$	$\mathcal{N}\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$	$\chi^2\left(\sum_{i=1}^n \nu_i\right)$

Ainsi, toute *var* définie comme une combinaison linéaire de  $n$  *var* indépendantes suivant chacune une loi normale suit une loi normale.

**Matrice de covariance :**

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathbb{V}(X_1) & \mathbb{C}(X_1, X_2) & \dots & \dots & \mathbb{C}(X_1, X_n) \\ \mathbb{C}(X_2, X_1) & \mathbb{V}(X_2) & \dots & \dots & \mathbb{C}(X_2, X_n) \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \mathbb{C}(X_{n-1}, X_n) \\ \mathbb{C}(X_n, X_1) & \dots & \dots & \dots & \mathbb{V}(X_n) \end{pmatrix}.$$

**Espérance et variance d'une somme de  $n$  *var* :**

$$\mathbb{E} \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i), \quad \mathbb{V} \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) + 2 \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} \mathbb{C}(X_i, X_j).$$

$X_1, \dots, X_n$  indépendantes  $\Rightarrow$

$$\mathbb{V} \left( \sum_{i=1}^n X_i \right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i).$$

**Bilinéarité de la covariance :**

$$\mathbb{C} \left( \sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^q b_j Y_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^q a_i b_j \mathbb{C}(X_i, Y_j).$$

**Paramètres d'un vecteur de *var* :** Les principaux paramètres d'un vecteur (colonne) de *var*

$X = (X_1, \dots, X_n)^t$  sont son espérance :  $\mathbb{E}_n(X) = (\mathbb{E}(X_1), \dots, \mathbb{E}(X_n))^t$ , et sa matrice de covariance  $\Sigma$ .

**Propriétés :** Soient  $X = (X_1, \dots, X_n)^t$  un vecteur (colonne) de *var* d'espérance  $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)^t$  et de matrice de covariance  $\Sigma$ ,  $A$  une matrice à  $n$  colonnes et  $U = (U_1, \dots, U_n)^t$  un vecteur de *var* défini par  $U = AX$ . Alors

- l'espérance de  $U$  est  $A\mu$ ,
- la matrice de covariance de  $U$  est  $\Sigma_* = A\Sigma A^t$ .

**Fonction caractéristique d'un vecteur de *var* à densité :**

$$\begin{aligned}\varphi(t_1, \dots, t_n) &= \mathbb{E}(e^{it_1 X_1 + \dots + it_n X_n}) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{it_1 X_1 + \dots + it_n X_n} f_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n, \quad (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n.\end{aligned}$$

**Vecteur aléatoire réel gaussien (*vectarg*) :**

- $(X_1, \dots, X_n)^t$  est un vecteur aléatoire réel gaussien (*vectarg*) (vecteur colonne)  $\Leftrightarrow$  toute les combinaisons linéaires de  $X_1, \dots, X_n$  suivent une loi normale : pour tout  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $\sum_{i=1}^n a_i X_i$  suit une loi normale,
- Un *vectarg*  $(X_1, \dots, X_n)^t$  est caractérisé par son espérance  $\mu$  et sa matrice de covariance  $\Sigma$ .  
La loi de  $(X_1, \dots, X_n)^t$  est notée  $\mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$ .

**Vectarg et indépendance :** Si  $(X_1, \dots, X_n)^t$  est un *vectarg* alors  $X_i$  et  $X_j$  indépendantes  $\Leftrightarrow$

$$\mathbb{C}(X_i, X_j) = 0.$$

**Densité et fonction caractéristique d'un *vectarg* :** Soit  $(X_1, \dots, X_n)^t \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$  avec

$$\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)^t.$$

- Si  $\det(\Sigma) > 0$ , alors  $(X_1, \dots, X_n)^t$  possède la densité :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2}(x_1 - \mu_1, \dots, x_n - \mu_n)\Sigma^{-1}(x_1 - \mu_1, \dots, x_n - \mu_n)^t},$$

$$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

- La fonction caractéristique de  $(X_1, \dots, X_n)^t$  est

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) = e^{i(\mu_1, \dots, \mu_n)(t_1, \dots, t_n)^t - \frac{1}{2}(t_1, \dots, t_n)\Sigma(t_1, \dots, t_n)^t}, \quad (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n.$$

**Système linéaire et *vectarg* :** Soient  $Z \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$ ,  $A$  une matrice à  $n$  colonnes et  $c$  un vecteur colonne à  $n$  composantes et  $W$  tel que  $W = AZ + c$ . Alors on a

$$W \sim \mathcal{N}_n(A\mu + c, A\Sigma A^t).$$

**Lois usuelles associées à la loi normale** : Soient  $X_1, \dots, X_n$  *n var iid* suivant chacune la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . On pose

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Alors on a

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n) = \mu, \quad \mathbb{E}(S_n^2) = \sigma^2.$$

De plus :

<i>var</i>	$\sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right)$	$\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2$	$\sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n} \right)$	$\sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$
Loi	$\mathcal{N}(0, 1)$	$\chi^2(n-1)$	$\mathcal{T}(n-1)$	$\chi^2(n)$



## 17 Convergences de suites de *var*; généralité

**Suite de *var* indépendantes :**  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une suite de *var* indépendantes  $\Leftrightarrow$  toute sous-famille finie extraite de  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est une famille de *var* indépendantes.

**Convergence en probabilité :**  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en probabilité vers  $X \Leftrightarrow$  pour tout  $\epsilon > 0$ , on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0.$$

**Loi faible des grands nombres :** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de *var iid* admettant un moment d'ordre

2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Alors  $(\bar{X}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en probabilité vers  $\mathbb{E}(X_1)$ .

**Convergence en loi :** Une suite de *var*  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en loi vers  $X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$

en tout point de continuité  $x$  de  $F_X \Leftrightarrow$  pour toute fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue bornée, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(g(X_n)) = \mathbb{E}(g(X)) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(t) = \varphi_X(t), t \in \mathbb{R}.$$

**Théorème central limite :** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de *var iid* admettant un moment d'ordre 2.

Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mathbb{E}(\bar{X}_n)}{\sigma(\bar{X}_n)} = \sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mathbb{E}(X_1)}{\sigma(X_1)} \right).$$

Alors la suite de *var*  $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en loi vers une *var*  $Z$  suivant la loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

**Théorème de continuité (continuous mapping theorem) :**

- $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en probabilité vers  $X \Rightarrow$  pour toute fonction  $g : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  continue, sauf, éventuellement, en un nombre fini de points,  $(g(X_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en probabilité vers  $g(X)$ .
- $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en loi vers  $X \Rightarrow$  pour toute fonction  $g : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  continue, sauf, éventuellement, en un nombre fini de points,  $(g(X_n))_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en loi vers  $g(X)$ .

**Convergence dans  $\mathbb{L}^p$  :**  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge dans  $\mathbb{L}^p$  vers  $X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n - X|^p) = 0$ .

**Hiérarchie :**

- Convergence dans  $\mathbb{L}^p$  vers  $X \Rightarrow$  convergence en probabilité vers  $X \Rightarrow$  convergence en loi vers  $X$ .
- Convergence en probabilité vers 0  $\Leftrightarrow$  convergence en loi vers 0.

**Convergence presque sûre :**  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge presque sûrement (*ps*) vers  $X \Leftrightarrow$

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega; \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}) = 1.$$

**Critère de convergence *ps* :** Pour tout  $\epsilon > 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) < \infty \Rightarrow (X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge *ps* vers  $X$ .

**Loi forte des grands nombres :** Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de *var iid* admettant une espérance. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Alors  $(\bar{X}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge *ps* vers  $\mathbb{E}(X_1)$ .

**Hiérarchie :** Convergence *ps*  $\Rightarrow$  convergence en probabilité  $\Rightarrow$  convergence en loi. En revanche, il n'y a pas d'implication entre la convergence dans  $\mathbb{L}^p$  et la convergence *ps*.

## 18 Introduction à l'estimation paramétrique

**$n$ -échantillon :** On appelle  $n$ -échantillon d'une var  $X$   $n$  var  $X_1, \dots, X_n$  iid suivant la même loi que celle de  $X$ .

**Estimation paramétrique :** Soit  $X$  une var dont la loi dépend d'au moins un paramètre  $\theta$  inconnu. L'objectif est d'évaluer ce paramètre à l'aide d'un  $n$ -échantillon  $X_1, \dots, X_n$  de  $X$ .

**Estimateur :** On appelle estimateur  $\hat{\theta}_n$  de  $\theta$  toute fonction de  $X_1, \dots, X_n$ .

**Biais :**

$$B(\hat{\theta}_n, \theta) = \mathbb{E}(\hat{\theta}_n) - \theta.$$

$$\hat{\theta}_n \text{ est sans biais (de } \theta) \Leftrightarrow B(\hat{\theta}_n, \theta) = 0 \Leftrightarrow \mathbb{E}(\hat{\theta}_n) = \theta.$$

**Risque quadratique :**

$$R(\hat{\theta}_n, \theta) = \mathbb{E}((\hat{\theta}_n - \theta)^2).$$

Plus  $R(\hat{\theta}_n, \theta)$  est petit, plus l'estimateur  $\hat{\theta}_n$  estime bien  $\theta$ .

Si  $\hat{\theta}_n$  est sans biais, alors on a  $R(\hat{\theta}_n, \theta) = \mathbb{V}(\hat{\theta}_n)$ .

**Estimateur consistant :**  $\hat{\theta}_n$  est consistant  $\Leftrightarrow (\hat{\theta}_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge en probabilité vers  $\theta$ .

**Méthode des moments :** La méthode des moments permet de construire un estimateur  $\hat{\theta}_n$  de  $\theta$  :

1. On détermine une fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\mathbb{E}(X_1) = g(\theta)$ .
2. On isole  $\theta$  en fonction de  $\mathbb{E}(X_1)$  :  $\theta = g^{-1}(\mathbb{E}(X_1))$ .
3. On estime  $\mathbb{E}(X_1)$  par  $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ .
4. L'estimateur  $\hat{\theta}_n$  de  $\theta$  par la méthode des moments est :  $\hat{\theta}_n = g^{-1}(\bar{X}_n)$ .

**Intervalle de confiance :** Un intervalle de confiance pour  $\theta$  au niveau  $100(1 - \alpha)\%$ ,  $\alpha \in ]0, 1[$ , est un intervalle de la forme  $I_\theta = [a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)]$ , où  $a(X_1, \dots, X_n)$  et  $b(X_1, \dots, X_n)$  désignent deux fonctions dépendantes de  $X_1, \dots, X_n$ , tel que

$$\mathbb{P}(\theta \in I_\theta) = 1 - \alpha.$$

Pour que  $I_\theta$  contienne avec une forte probabilité  $\theta$ , on prend  $\alpha$  petit :  $\alpha = 0,05, \alpha = 0,01 \dots$

En pratique, on dispose de données  $x_1, \dots, x_n$ , lesquelles sont des réalisations de  $X_1, \dots, X_n$ .

Une réalisation de  $I_\theta$  est donc :

$$i_\theta = [a(x_1, \dots, x_n), b(x_1, \dots, x_n)],$$

donnant ainsi un intervalle de valeurs dans laquelle  $\theta$  a  $100(1 - \alpha)\%$  de chances d'appartenir.

Les intervalles de confiance associés à une  $var X$  suivant une loi normale sont donnés dans la Section 18 page 68.

**Hypothèses statistiques :** On oppose deux hypothèses complémentaires :  $H_0$  et  $H_1$ ,

- l'hypothèse  $H_0$  formule ce que l'on souhaite rejeter/réfuter,
- l'hypothèse  $H_1$  formule ce que l'on souhaite montrer.

Par exemple, si on veut montrer l'hypothèse "le produit est non conforme",  $H_0$  et  $H_1$  s'opposent sous la forme :

$$H_0 : \text{"le produit est conforme"} \quad \text{contre} \quad H_1 : \text{"le produit est non conforme"}.$$

**p-valeur :** La p-valeur est le plus petit réel  $\alpha \in ]0, 1[$  calculé à partir des données tel que l'on puisse se permettre de rejeter  $H_0$  au risque  $100\alpha\%$ .

**Degrés de significativité :** La p-valeur nous donne un degré de significativité du rejet de  $H_0$ .

Le rejet de  $H_0$  sera :

- significatif si p-valeur  $\in ]0.01, 0.05]$ , symbolisé par \*,
- très significatif si p-valeur  $\in ]0.001, 0.01]$ , symbolisé par \*\*,
- hautement significatif si p-valeur  $< 0.001$ , symbolisé par \*\*\*.

Il y a non rejet de  $H_0$  si p-valeur  $> 0.05$ .

S'il y a non-rejet de  $H_0$ , sauf convention, on ne peut rien conclure du tout (avec le risque considéré). En revanche, peut-être qu'un risque de départ plus élevé ou la disposition de plus de données peuvent conduire à un rejet de  $H_0$ .

Les tests statistiques associés à une  $var X$  suivant une loi normale sont présentés dans la Section 19 page 69.

## 19 Intervalles de confiance

Lois :  $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ ,  $T \sim \mathcal{T}(\nu)$ ,  $K \sim \chi^2(\nu)$ ,  $\nu = n - 1$ . Niveau :  $100(1 - \alpha)\%$ ,  $\alpha \in ]0,1[$ .

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	valeurs	$i_\mu$
$\sigma$ connu Z-IntConf	$\mathbb{P}( Z  \geq z_\alpha) = \alpha$	$\left[ \bar{x} - z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$
$\sigma$ inconnu T-IntConf	$\mathbb{P}( T  \geq t_\alpha(\nu)) = \alpha$	$\left[ \bar{x} - t_\alpha(\nu) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_\alpha(\nu) \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$
$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	valeurs	$i_{\sigma^2}$
Chi-Square-IntConf	$\mathbb{P}(K \geq a_\alpha(\nu)) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ $\mathbb{P}(K \geq b_\alpha(\nu)) = \frac{\alpha}{2}$	$\left[ \frac{n-1}{b_\alpha(\nu)} s^2, \frac{n-1}{a_\alpha(\nu)} s^2 \right]$
$n \geq 31$ (parfois utilisé)	$\mathbb{P}( Z  \geq z_\alpha) = \alpha$	$\left[ \frac{2(n-1)s^2}{(\sqrt{2n-3} + z_\alpha)^2}, \frac{2(n-1)s^2}{(\sqrt{2n-3} - z_\alpha)^2} \right]$
$X \sim \mathcal{B}(p)$	valeurs	$i_p$
$n \geq 31$ $np_1 \geq 5, n(1 - p_2) \geq 5$ Prop-Z-IntConf	$\mathbb{P}( Z  \geq z_\alpha) = \alpha$	$\left[ \bar{x} - z_\alpha \frac{\sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}}{\sqrt{n-1}}, \bar{x} + z_\alpha \frac{\sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}}{\sqrt{n-1}} \right] = [p_1, p_2]$
X de loi quelconque	valeurs	$i_{\mathbb{E}(X)}$
$n \geq 1000$ Z-IntConf-Lim	$\mathbb{P}( Z  \geq z_\alpha) = \alpha$	$\left[ \bar{x} - z_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$

## 20 Tests de conformité

Lois :  $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ ,  $T \sim \mathcal{T}(\nu)$ ,  $K \sim \chi^2(\nu)$ ,  $\nu = n - 1$ . Rejet de  $H_0$  au risque  $100\alpha\%$   $\Leftrightarrow$  p-valeur  $\leq \alpha$ .

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$H_0$	$H_1$	Stat. test obs.	p-valeurs
$\sigma$ connu : Z-Test	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$z_{obs} = \sqrt{n} \left( \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \right)$	$\mathbb{P}( Z  \geq  z_{obs} )$
	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$\mathbb{P}(Z \geq z_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( Z  \geq z_{obs}) \text{ si } z_{obs} > 0 \right)$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$\mathbb{P}(Z \leq z_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( Z  \geq -z_{obs}) \text{ si } z_{obs} < 0 \right)$
$\sigma$ inconnu : T-Test	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$t_{obs} = \sqrt{n} \left( \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \right)$	$\mathbb{P}( T  \geq  t_{obs} )$
	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$\mathbb{P}(T \geq t_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( T  \geq t_{obs}) \text{ si } t_{obs} > 0 \right)$
	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$\mathbb{P}(T \leq t_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( T  \geq -t_{obs}) \text{ si } t_{obs} < 0 \right)$
1-Chi2-Test	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi_{obs}^2 = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2$	$2 \min(\mathbb{P}(K \geq \chi_{obs}^2), \mathbb{P}(K \leq \chi_{obs}^2))$
	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\mathbb{P}(K \geq \chi_{obs}^2)$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\mathbb{P}(K \leq \chi_{obs}^2)$
$n \geq 31$ (parfois utilisé)	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$z_{obs} = \sqrt{\frac{2(n-1)}{\sigma_0^2} s^2 - \sqrt{2n-3}}$	$\mathbb{P}( Z  \geq  z_{obs} )$
	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\mathbb{P}(Z \geq z_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( Z  \geq z_{obs}) \text{ si } z_{obs} > 0 \right)$
	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\mathbb{P}(Z \leq z_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( Z  \geq -z_{obs}) \text{ si } z_{obs} < 0 \right)$
$X \sim \mathcal{B}(p)$	$H_0$	$H_1$	stat. test obs. et var	p-valeurs
$n \geq 31$ , $np_0 \geq 5$ , $n(1-p_0) \geq 5$ : 1-Prop-Z-Test	$p = p_0$	$p \neq p_0$	$z_{obs} = \sqrt{n} \left( \frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \right)$	$\mathbb{P}( Z  \geq  z_{obs} )$
	$p \leq p_0$	$p > p_0$		$\mathbb{P}(Z \geq z_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( Z  \geq z_{obs}) \text{ si } z_{obs} > 0 \right)$
	$p \geq p_0$	$p < p_0$		$\mathbb{P}(Z \leq z_{obs}) \left( = \frac{1}{2} \mathbb{P}( Z  \geq -z_{obs}) \text{ si } z_{obs} < 0 \right)$

**(Table 1) Loi normale 1**

Soit  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . La table ci-dessous donne, pour un  $\alpha$  choisi, la valeur  $z_\alpha$  telle que  $\mathbb{P}(|Z| \geq z_\alpha) = \alpha$ .

$\alpha$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	$\infty$	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,10	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,20	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,30	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,40	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,50	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539
0,60	0,524	0,510	0,496	0,482	0,468	0,454	0,440	0,426	0,412	0,399
0,70	0,385	0,372	0,358	0,345	0,332	0,319	0,305	0,292	0,279	0,266
0,80	0,253	0,240	0,228	0,215	0,202	0,189	0,176	0,164	0,151	0,138
0,90	0,126	0,113	0,100	0,088	0,075	0,063	0,050	0,038	0,025	0,013

**(Table 2) Loi normale 2**

Soit  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . La table de valeurs ci-dessous donne les valeurs de  $F(x) = \mathbb{P}(Z \leq x)$ , avec  $x \in [0; 3,99]$  et  $x = x_1 + x_2$ .

$x_1 \backslash x_2$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000



**(Table 3) Loi normale 3**

Soit  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . La table ci-dessous donne, pour un  $z$  choisi, la valeur  $\alpha$  telle que  $\mathbb{P}(|Z| \geq z) = \alpha$ .

$z$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	1,00000	0,99202	0,98404	0,97607	0,96809	0,96012	0,95216	0,94419	0,93624	0,92829
0,10	0,92034	0,91241	0,90448	0,89657	0,88866	0,88076	0,87288	0,86501	0,85715	0,84931
0,20	0,84148	0,83367	0,82587	0,81809	0,81033	0,80259	0,79486	0,78716	0,77948	0,77182
0,30	0,76418	0,75656	0,74897	0,74140	0,73386	0,72634	0,71885	0,71138	0,70395	0,69654
0,40	0,68916	0,68181	0,67449	0,66720	0,65994	0,65271	0,64552	0,63836	0,63123	0,62413
0,50	0,61708	0,61005	0,60306	0,59611	0,58920	0,58232	0,57548	0,56868	0,56191	0,55519
0,60	0,54851	0,54186	0,53526	0,52869	0,52217	0,51569	0,50925	0,50286	0,49650	0,49019
0,70	0,48393	0,47770	0,47152	0,46539	0,45930	0,45325	0,44725	0,44130	0,43539	0,42953
0,80	0,42371	0,41794	0,41222	0,40654	0,40091	0,39533	0,38979	0,38430	0,37886	0,37347
0,90	0,36812	0,36282	0,35757	0,35237	0,34722	0,34211	0,33706	0,33205	0,32709	0,32217
1,00	0,31731	0,31250	0,30773	0,30301	0,29834	0,29372	0,28914	0,28462	0,28014	0,27571
1,10	0,27133	0,26700	0,26271	0,25848	0,25429	0,25014	0,24605	0,24200	0,23800	0,23405
1,20	0,23014	0,22628	0,22246	0,21870	0,21498	0,21130	0,20767	0,20408	0,20055	0,19705
1,30	0,19360	0,19020	0,18684	0,18352	0,18025	0,17702	0,17383	0,17069	0,16759	0,16453
1,40	0,16151	0,15854	0,15561	0,15272	0,14987	0,14706	0,14429	0,14156	0,13887	0,13622
1,50	0,13361	0,13104	0,12851	0,12602	0,12356	0,12114	0,11876	0,11642	0,11411	0,11183
1,60	0,10960	0,10740	0,10523	0,10310	0,10101	0,09894	0,09691	0,09492	0,09296	0,09103
1,70	0,08913	0,08727	0,08543	0,08363	0,08186	0,08012	0,07841	0,07673	0,07508	0,07345
1,80	0,07186	0,07030	0,06876	0,06725	0,06577	0,06431	0,06289	0,06148	0,06011	0,05876
1,90	0,05743	0,05613	0,05486	0,05361	0,05238	0,05118	0,05000	0,04884	0,04770	0,04659
2,00	0,04550	0,04443	0,04338	0,04236	0,04135	0,04036	0,03940	0,03845	0,03753	0,03662
2,10	0,03573	0,03486	0,03401	0,03317	0,03235	0,03156	0,03077	0,03001	0,02926	0,02852
2,20	0,02781	0,02711	0,02642	0,02575	0,02509	0,02445	0,02382	0,02321	0,02261	0,02202
2,30	0,02145	0,02089	0,02034	0,01981	0,01928	0,01877	0,01827	0,01779	0,01731	0,01685
2,40	0,01640	0,01595	0,01552	0,01510	0,01469	0,01429	0,01389	0,01351	0,01314	0,01277
2,50	0,01242	0,01207	0,01174	0,01141	0,01109	0,01077	0,01047	0,01017	0,00988	0,00960
2,60	0,00932	0,00905	0,00879	0,00854	0,00829	0,00805	0,00781	0,00759	0,00736	0,00715
2,70	0,00693	0,00673	0,00653	0,00633	0,00614	0,00596	0,00578	0,00561	0,00544	0,00527
2,80	0,00511	0,00495	0,00480	0,00465	0,00451	0,00437	0,00424	0,00410	0,00398	0,00385
2,90	0,00373	0,00361	0,00350	0,00339	0,00328	0,00318	0,00308	0,00298	0,00288	0,00279
3,00	0,00270	0,00261	0,00253	0,00245	0,00237	0,00229	0,00221	0,00214	0,00207	0,00200
3,10	0,00194	0,00187	0,00181	0,00175	0,00169	0,00163	0,00158	0,00152	0,00147	0,00142
3,20	0,00137	0,00133	0,00128	0,00124	0,00120	0,00115	0,00111	0,00108	0,00104	0,00100
3,30	0,00097	0,00093	0,00090	0,00087	0,00084	0,00081	0,00078	0,00075	0,00072	0,00070
3,40	0,00067	0,00065	0,00063	0,00060	0,00058	0,00056	0,00054	0,00052	0,00050	0,00048
3,50	0,00047	0,00045	0,00043	0,00042	0,00040	0,00039	0,00037	0,00036	0,00034	0,00033
3,60	0,00032	0,00031	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024	0,00023	0,00022
3,70	0,00022	0,00021	0,00020	0,00019	0,00018	0,00018	0,00017	0,00016	0,00016	0,00015
3,80	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013	0,00012	0,00012	0,00011	0,00011	0,00010	0,00010
3,90	0,00010	0,00009	0,00009	0,00008	0,00008	0,00008	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
4,00	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00004

(Table 4) Loi de Student à  $\nu$  degrés de liberté

Soit  $T \sim \mathcal{T}(\nu)$ . La table ci-dessous donne, pour un  $\alpha$  et un  $\nu$  choisis, la valeur  $t_\alpha(\nu)$  telle que  $\mathbb{P}(|T| \geq t_\alpha(\nu)) = \alpha$ .

$\nu \backslash \alpha$	0,90	0,50	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,001
1	0,158	1,000	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619
2	0,142	0,816	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,598
3	0,137	0,765	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	0,134	0,741	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	0,132	0,727	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869
6	0,131	0,718	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	0,130	0,711	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408
8	0,130	0,706	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	0,129	0,703	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	0,129	0,700	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	0,129	0,697	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	0,128	0,695	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	0,128	0,694	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	0,128	0,692	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	0,128	0,691	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	0,128	0,690	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	0,128	0,689	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	0,127	0,688	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
19	0,127	0,688	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	0,127	0,687	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850
21	0,127	0,686	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
22	0,127	0,686	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792
23	0,127	0,685	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,767
24	0,127	0,685	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745
25	0,127	0,684	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725
26	0,127	0,684	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707
27	0,127	0,684	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690
28	0,127	0,683	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674
29	0,127	0,683	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659
30	0,127	0,683	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646

**(Table 5) Loi du chi-deux à  $\nu$  degrés de liberté**

Soit  $K \sim \chi^2(\nu)$ . La table ci-dessous donne, pour un  $\alpha$  et un  $\nu$  choisis, la valeur  $k_\alpha(\nu)$  telle que  $\mathbb{P}(K \geq k_\alpha(\nu)) = \alpha$ .

$\nu \backslash \alpha$	0,99	0,975	0,95	0,90	0,10	0,05	0,025	0,01	0,001
1	0,0002	0,001	0,004	0,016	2,71	3,84	5,02	6,63	10,83
2	0,02	0,05	0,10	0,21	4,61	5,99	7,38	9,21	13,82
3	0,11	0,22	0,35	0,58	6,25	7,81	9,35	11,34	16,27
4	0,30	0,48	0,71	1,06	7,78	9,49	11,14	13,28	18,47
5	0,55	0,83	1,15	1,61	9,24	11,07	12,83	15,09	20,51
6	0,87	1,24	1,64	2,20	10,64	12,59	14,45	16,81	22,46
7	1,24	1,69	2,17	2,83	12,02	14,07	16,01	18,48	24,32
8	1,65	2,18	2,73	3,49	13,36	15,51	17,53	20,09	26,12
9	2,09	2,70	3,33	4,17	14,68	16,92	19,02	21,67	27,88
10	2,56	3,25	3,94	4,87	15,99	18,31	20,48	23,21	29,59
11	3,05	3,82	4,57	5,58	17,28	19,68	21,92	24,73	31,26
12	3,57	4,40	5,23	6,30	18,55	21,03	23,34	26,22	32,91
13	4,11	5,01	5,89	7,04	19,81	22,36	24,74	27,69	34,53
14	4,66	5,63	6,57	7,79	21,06	23,68	26,12	29,14	36,12
15	5,23	6,26	7,26	8,55	22,31	25,00	27,49	30,58	37,70
16	5,81	6,91	7,96	9,31	23,54	26,30	28,85	32,00	39,25
17	6,41	7,56	8,67	10,09	24,77	27,59	30,19	33,41	40,79
18	7,01	8,23	9,39	10,86	25,99	28,87	31,53	34,81	42,31
19	7,63	8,91	10,12	11,65	27,20	30,14	32,85	36,19	43,82
20	8,26	9,59	10,85	12,44	28,41	31,41	34,17	37,57	45,31
21	8,90	10,28	11,59	13,24	29,62	32,67	35,48	38,93	46,80
22	9,54	10,98	12,34	14,04	30,81	33,92	36,78	40,29	48,27
23	10,20	11,69	13,09	14,85	32,01	35,17	38,08	41,64	49,73
24	10,86	12,40	13,85	15,66	33,20	36,42	39,36	42,98	51,18
25	11,52	13,12	14,61	16,47	34,38	37,65	40,65	44,31	52,62
26	12,20	13,84	15,38	17,29	35,56	38,89	41,92	45,64	54,05
27	12,88	14,57	16,15	18,11	36,74	40,11	43,19	46,96	55,48
28	13,56	15,31	16,93	18,94	37,92	41,34	44,46	48,28	56,89
29	14,26	16,05	17,71	19,77	39,09	42,56	45,72	49,59	58,30
30	14,95	16,79	18,49	20,60	40,26	43,77	46,98	50,89	59,70

**(Table 6) Loi de Fisher à  $(\nu_1, \nu_2)$  degrés de liberté ( $\alpha = 0,025$ )**

Soit  $F \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ . La table ci-dessous donne, pour un  $\alpha$ , un  $\nu_1$  et un  $\nu_2$  choisis, la valeur  $f_\alpha(\nu_1, \nu_2)$  telle que  $\mathbb{P}(F \geq f_\alpha(\nu_1, \nu_2)) = \alpha = 0,025$ .

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	30
1	648	800	864	900	922	937	957	969	985	993	1001
2	38,5	39,0	39,2	39,2	39,3	39,3	39,4	39,4	39,4	39,4	39,5
3	17,4	16,0	15,4	15,1	14,9	14,7	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1
4	12,2	10,6	9,98	9,60	9,36	9,20	8,98	8,84	8,66	8,56	8,46
5	10,0	8,43	7,76	7,39	7,15	6,98	6,76	6,62	6,43	6,33	6,23
6	8,81	7,26	6,60	6,23	5,99	5,82	5,60	5,46	5,27	5,17	5,07
7	8,07	6,54	5,89	5,52	5,29	5,12	4,90	4,76	4,57	4,47	4,36
8	7,57	6,06	5,42	5,05	4,82	4,65	4,43	4,30	4,10	4,00	3,89
9	7,21	5,71	5,08	4,72	4,48	4,32	4,10	3,96	3,77	3,67	3,56
10	6,94	5,46	4,83	4,47	4,24	4,07	3,85	3,72	3,52	3,42	3,31
11	6,72	5,26	4,63	4,28	4,04	3,88	3,66	3,53	3,33	3,23	3,12
12	6,55	5,10	4,47	4,12	3,89	3,73	3,51	3,37	3,18	3,07	2,96
13	6,41	4,97	4,35	4,00	3,77	3,60	3,39	3,25	3,05	2,95	2,84
14	6,30	4,86	4,24	3,89	3,66	3,50	3,29	3,15	2,95	2,84	2,73
15	6,20	4,76	4,15	3,80	3,58	3,41	3,20	3,06	2,86	2,76	2,64
16	6,12	4,69	4,08	3,73	3,50	3,34	3,12	2,99	2,79	2,68	2,57
17	6,04	4,32	4,01	3,66	3,44	3,28	3,06	2,92	2,72	2,62	2,50
18	5,98	4,56	3,95	3,61	3,38	3,22	3,01	2,87	2,67	2,56	2,44
19	5,92	4,51	3,90	3,56	3,33	3,17	2,96	2,82	2,62	2,51	2,39
20	5,87	4,46	3,86	3,51	3,29	3,13	2,91	2,77	2,57	2,46	2,35
22	5,79	4,38	3,78	3,44	3,22	3,05	2,84	2,70	2,50	2,39	2,27
24	5,72	4,32	3,72	3,38	3,15	2,99	2,78	2,64	2,44	2,33	2,21
26	5,66	4,27	3,67	3,33	3,10	2,94	2,73	2,59	2,39	2,28	2,16
28	5,61	4,22	3,63	3,29	3,06	2,90	2,69	2,55	2,34	2,23	2,11
30	5,57	4,18	3,59	3,25	3,03	2,87	2,65	2,51	2,31	2,20	2,07
40	5,42	4,05	3,46	3,13	2,90	2,74	2,53	2,39	2,18	2,07	1,94
50	5,34	3,98	3,39	3,06	2,83	2,67	2,46	2,32	2,11	1,99	1,87
60	5,29	3,93	3,34	3,01	2,79	2,63	2,41	2,27	2,06	1,94	1,82
80	5,22	3,86	3,28	2,95	2,73	2,57	2,36	2,21	2,00	1,88	1,75
100	5,18	3,83	3,25	2,92	2,70	2,54	2,32	2,18	1,97	1,85	1,71

**(Table 7) Loi de Fisher à  $(\nu_1, \nu_2)$  degrés de liberté ( $\alpha = 0,05$ )**

Soit  $F \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ . La table ci-dessous donne, pour un  $\alpha$ , un  $\nu_1$  et un  $\nu_2$  choisis, la valeur  $f_\alpha(\nu_1, \nu_2)$  telle que  $\mathbb{P}(F \geq f_\alpha(\nu_1, \nu_2)) = \alpha = 0,05$ .

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5	6	8	10	15	20	30
1	161	300	216	225	230	234	239	242	246	248	250
2	18,5	19	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,85	8,79	8,70	8,66	8,62
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,96	5,86	5,80	5,75
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,74	4,62	4,56	4,50
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,06	3,94	3,87	3,81
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,64	3,51	3,44	3,38
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,35	3,22	3,15	3,08
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,14	3,01	2,94	2,86
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,98	2,85	2,77	2,70
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,85	2,72	2,65	2,57
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,75	2,62	2,54	2,47
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,77	2,67	2,53	2,46	2,38
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,60	2,46	2,39	2,31
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,54	2,40	2,33	2,25
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,49	2,35	2,28	2,19
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,45	2,31	2,23	2,15
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,41	2,27	2,19	2,11
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,38	2,23	2,16	2,07
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,35	2,20	2,12	2,04
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,30	2,15	2,07	1,98
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,25	2,11	2,03	1,94
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,22	2,07	1,99	1,90
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,29	2,19	2,04	1,96	1,87
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,16	2,01	1,93	1,84
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2,08	1,92	1,84	1,74
50	4,03	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,13	2,03	1,87	1,78	1,69
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,10	1,99	1,84	1,75	1,65
80	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,21	2,06	1,95	1,79	1,70	1,60
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,31	2,19	2,03	1,93	1,77	1,68	1,57

# Index

- $n$ -échantillon, 66
- .Loi d'un couple de var , 27
- .Loi d'un vecteur de var , 32
- .Loi d'une var , 18
  
- Approximation loi binomiale, 24, 35, 51
- Approximation loi de Poisson, 24, 35, 51
- Arbre de probabilité, 16
- Arrangement, 7
  
- Biais, 66
- Bilinéarité de la covariance, 61
  
- Calcul des intégrales doubles, 39
- Calculs usuels, 40
- Cardinal, 6
- Changement de variable, 38
- Changement de variable en coordonnées polaires, 39
- Coefficient binomial, 9
- Coefficient de corrélation linéaire, 31, 57
- Combinaison, 7
- Convergence dans  $\mathbb{L}^p$ , 64
- Convergence en loi, 35, 64
- Convergence en probabilité, 35, 64
- Couple de var discrètes, 27
- Couple de *var* à densité, 52
- Covariance, 56
  
- Degrés de significativité, 67
- Densité, 40, 52, 59
- Densité de  $X + Y$ , 55
  
- Densités marginales, 53, 59
- Dénombrement, 5
  
- Ecart-type, 20, 43
- Egalité en loi, 42
- Equiprobabilité, 13
- Espace probabilisé, 12
- Espérance, 19, 42
- Espérance d'une somme de var, 61
- Estimateur, 66
- Estimateur consistant, 66
- Estimation paramétrique, 66
- Événement, 11
- Expérience aléatoire, 11
  
- Fonction de répartition, 19, 33, 40, 52, 59
- Fonction génératrice, 21, 30, 33
- Formule d'inclusion-exclusion, 13
- Formule de Bayes, 15
- Formule de König-Huyghens, 20, 43
- Formule de Vandermonde, 9
- Formule des probabilités composées, 15
- Formule des probabilités totales, 15
- Formule du binôme de Newton, 9
- Formule du crible, 6
- Formule du transfert, 19, 29, 33, 42, 56, 60
  
- Hypothèses statistiques, 67
  
- iid, 29, 54
- Indépendance, 53, 60
- Indépendance (événements), 17

- Indépendance de var discrètes, 28, 33
- Intervalle de confiance, 66
- Intervalle de confiance, 68
- Intégration par parties, 38
- Inégalité de Bienaymé-Tchebychev, 43
- Inégalité de Cauchy-Schwarz, 29, 56
- Inégalité de Markov, 20, 43
  
- Linéarité de l'espérance, 56
- Liste, 7
- Loi binomiale, 23
- Loi binomiale négative, 24
- Loi bêta, 46
- Loi de Bernoulli, 22
- Loi de Cauchy, 47
- Loi de Fisher, 48, 56, 63
- Loi de Laplace, 46
- Loi de Pareto, 47
- Loi de Pascal, 23
- Loi de Poisson, 24
- Loi de Rademacher, 22
- Loi de Student, 48, 55, 63
- Loi du Chi-deux, 47, 55, 63
- Loi exponentielle, 46
- Loi faible des grands nombres, 35, 64
- Loi gamma, 46
- Loi géométrique, 23
- Loi hypergéométrique, 23
- Loi normale, 47, 49
- Loi normale centrée réduite, 50
- Loi parabolique, 45
- Loi triangulaire, 45
- Loi uniforme, 45
  
- Loi uniforme discrète, 22
- Lois de Morgan, 6
- Lois marginales (discrètes), 28, 32
  
- Matrice de covariance, 31, 34, 56, 61
- Modélisation, 25
- Moment, 20, 42
- Moments d'une loi normale, 51
- Méthode de la fonction muette, 42, 56
- Méthode des moments, 66
  
- p-valeur, 67
- Primitive, 36
- Principe additif, 6
- Principe multiplicatif, 7
- Probabilité, 12
- Probabilité conditionnelle, 15
- Probabilité uniforme, 14, 19
- Produit de convolution, 55
- Propriétés de limite monotone, 13
  
- Retournement du conditionnement, 15
- Risque quadratique, 66
- Répétition d'expériences, 26
  
- Schéma d'urne, 25
- Somme partielle géométrique, 9
- Sommes doubles, 10
- Suite de var indépendantes, 35, 64
- Support, 18, 27, 32, 41, 52, 59
- Système complet d'événements, 12
- Série entière exponentielle, 10
- Série géométrique, 9
  
- Table  $\mathcal{N}(0, 1)$ , 51

---

Tests statistique, 69  
Théorème central limite, 64  
Théorème de continuité, 64  
Théorème du changement de variable, 54  
Tribu, 12  
Univers, 11  
Var discrète, 18  
Var symétrique, 42  
Var à densité, 40  
Variable aléatoire réelle (var) , 18  
Variance, 42  
Variance d'une somme de var, 31, 56, 61  
Vecteur de var discrètes, 32  
Vecteur gaussien, 57, 62