



**HAL**  
open science

## Socle théorique de la Statistique

Christophe Chesneau

► **To cite this version:**

| Christophe Chesneau. Socle théorique de la Statistique. Licence. France. 2016. cel-01387711v1

**HAL Id: cel-01387711**

**<https://cel.hal.science/cel-01387711v1>**

Submitted on 26 Oct 2016 (v1), last revised 6 Feb 2017 (v3)

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.


L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Socle théorique de la Statistique

---

Christophe Chesneau

<http://www.math.unicaen.fr/~chesneau/>





## Table des matières

<b>1 Variables aléatoires réelles à densité : l'essentiel</b>	<b>5</b>
<b>2 Loi normale</b>	<b>13</b>
2.1 Généralités . . . . .	13
2.2 Complément : sur la loi normale centrée réduite . . . . .	18
<b>3 Loi du Chi-deux</b>	<b>21</b>
<b>4 Loi de Student</b>	<b>27</b>
<b>5 Loi de Fisher</b>	<b>31</b>
<b>6 Loi du Chi-deux non centrée</b>	<b>37</b>
<b>7 Forme quadratique aléatoire</b>	<b>41</b>
<b>8 Complément : loi normale multidimensionnelle</b>	<b>45</b>
<b>9 Annexe : reproduction des graphiques</b>	<b>51</b>

~ **Note** ~

L'objectif de ce document est de présenter quelques bases mathématiques sur lesquelles reposent la Statistique paramétrique. Notamment, les principales lois de probabilités utilisées en Statistique seront étudiées (lois normale, de Student, du Chi-deux et de Fisher...).

Contact : [christophe.chesneau@gmail.com](mailto:christophe.chesneau@gmail.com)

Bonne lecture!



## 1 Variables aléatoires réelles à densité : l'essentiel

**Point de départ :** On suppose construit un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ . Lorsqu'une quantité est introduite (dérivée, intégrale, espérance, moments, variance ...), il est supposé que celle-ci existe.

**Variable aléatoire réelle (var) :** On appelle *var* toute application  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Support :** Le support d'une *var*  $X$ , noté  $X(\Omega)$ , est l'ensemble des valeurs atteintes par  $X$ . C'est la première chose à préciser lorsqu'on considère une *var*.

**Densité :** On appelle densité toute fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) \geq 0$ ,
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ .

**Var à densité :** On dit qu'une *var*  $X$  est à densité s'il existe une densité  $f$  telle que, pour tous  $a \leq b$ , on a

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

On dit alors que  $X$  est de densité  $f$  ou  $X$  possède la densité  $f$  ou  $f$  est une densité de  $X$ . La loi de  $X$  est caractérisée par  $f$ .

**Calculs usuels :**

$\mathbb{P}(X = a)$	$\mathbb{P}(X \leq b)$	$\mathbb{P}(X \geq a)$	$\mathbb{P}(a \leq X \leq b)$
0	$\int_{-\infty}^b f(x)dx$	$\int_a^{\infty} f(x)dx$	$\int_a^b f(x)dx = \int_{-\infty}^b f(x)dx - \int_{-\infty}^a f(x)dx$

On peut donc remplacer les inégalités larges par des inégalités strictes :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b) \dots$$

**Fonction de répartition :**

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

**Retour sur le support :** Soit  $F$  la fonction de répartition d'une *var*  $X$  de densité  $f$ . Alors  $X(\Omega)$  est l'adhérence de  $\{x \in \mathbb{R}; F(x) \in ]0, 1[ \}$ .

**Caractérisation d'une fonction de répartition :**

- $F$  est continue sur  $\mathbb{R}$ ,
- $F$  est croissante,
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$ .

**Densité et fonction de répartition :** Soit  $X$  une *var* à densité de fonction de répartition  $F$ . Alors une densité  $f$  de  $X$  est donnée par

$$f(x) = F'(x)$$

pour tout  $x \in X(\Omega)$  sauf les points où  $F$  n'est pas dérivable, et par ce qu'on veut ailleurs (du moment que  $f$  reste une densité).

**Égalité en loi :**  $X$  et  $Y$  suivent la même loi  $\Leftrightarrow F_X(x) = F_Y(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f_X(x) = f_Y(x)$

pour tout  $x \in \mathbb{R}$  sauf, éventuellement, en un nombre fini de points.

**Var symétrique :**  $X$  est symétrique  $\Leftrightarrow X$  et  $-X$  suivent la même loi.

$X$  possède une densité  $f$  paire  $\Rightarrow X$  est symétrique.

**Propriétés d'une var symétrique :**

- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\mathbb{P}(X \leq -x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x)$ ,
- pour tout  $x \geq 0$ ,  $\mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\mathbb{P}(X \leq x) - 1$ .

**Espérance :**

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx.$$

L'espérance de  $X$  est la valeur moyenne de  $X$ .

**Formule du transfert :** Pour toute fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , on a

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx.$$

**Propriétés élémentaires :**

- pour tout  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\mathbb{E}(a) = a$ ,
- $X(\Omega) \subseteq [0, \infty[ \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq 0$ ,
- $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ ,
- $\mathbb{E}(aX^2 + bX + c) = a\mathbb{E}(X^2) + b\mathbb{E}(X) + c$ .

Moment d'ordre  $r$  :

$$\mathbb{E}(X^r) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x) dx.$$

Espérance et *var* symétrique :  $X$  est symétrique  $\Rightarrow$  pour toute fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  impaire (si existence)  $\mathbb{E}(g(X)) = 0$ .

Variance :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

La variance de  $X$  mesure la dispersion des valeurs de  $X$  autour de son espérance.

Propriétés élémentaires :

- $\mathbb{V}(X) \geq 0$ ,
- $\mathbb{V}(X) = 0 \Leftrightarrow X$  est une *var* constante,
- $\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$ .

Formule de König-Huyghens :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

Écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

Tout comme la variance, l'écart-type de  $X$  mesure la dispersion des valeurs de  $X$  autour de son espérance. Il a l'avantage d'être de la même unité que  $X$  contrairement à la variance qui élève l'unité au carré.

Transformée de Laplace :

$$L(t) = \mathbb{E}(e^{tX}),$$

pour tout  $t$  telle que  $\mathbb{E}(e^{tX})$  existe.

Moments et transformée de Laplace :

$$\mathbb{E}(X^n) = L^{(n)}(0).$$

C'est pourquoi on appelle aussi  $L$  fonction génératrice des moments de  $X$ .

Égalité en loi et transformée de Laplace :  $X$  et  $Y$  suivent la même loi  $\Leftrightarrow L_X(t) = L_Y(t)$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .



**Vecteur de var :** Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var. On appelle vecteur de var l'application  $(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  vérifiant  $(X_1, \dots, X_n)(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ ,  $\omega \in \Omega$ .

**Support :** Le support d'un vecteur de var  $(X_1, \dots, X_n)$ , noté  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$ , est l'ensemble de ses valeurs possibles.

**Densité ( $n$ -dimensionnelle) :** On appelle densité ( $n$ -dimensionnelle) toute fonction  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

- pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(x_1, \dots, x_n) \geq 0$ ,
- $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 1$ .

**Vecteur de var à densité :** On dit qu'un vecteur de var  $(X_1, \dots, X_n)$  est à densité s'il existe une densité  $f$ , telle que, pour tout  $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ , on a

$$\mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{D}) = \int \dots \int_{\mathcal{D}} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

On dit alors que  $(X_1, \dots, X_n)$  est de densité  $f$  ou  $(X_1, \dots, X_n)$  possède la densité  $f$  ou  $f$  est une densité de  $(X_1, \dots, X_n)$ . La loi de  $(X_1, \dots, X_n)$  est caractérisée par  $f$ .

**Fonction de répartition :**

$$F(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq x_i\}\right), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

**Retour sur le support :** Soit  $F$  la fonction de répartition d'un vecteur de var  $(X_1, \dots, X_n)$  à densité.

On définit  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$  par l'adhérence de  $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n; F(x_1, \dots, x_n) \in ]0, 1[ \}$ .

**Densités marginales :** Une densité de  $X_1$  est donnée par

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n, \quad x_1 \in \mathbb{R}.$$

On définit de la même manière des densités pour d'autres var  $X_2, \dots, X_n$ .

**Densités de vecteurs de var composantes de  $(X_1, \dots, X_n)$  :** Une densité de  $(X_1, X_2)$  est donnée par

$$f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_n) dx_3 \dots dx_n, \quad (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

On définit de la même manière des densités d'autres vecteurs de var.

**Indépendance mutuelle de  $n$  var à densité** :  $X_1, \dots, X_n$  sont (mutuellement) indépendantes  $\Leftrightarrow$

$(X_1, \dots, X_n)$  possède la densité produit :  $\prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$ , *i.e.*

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  sauf, éventuellement, sur un ensemble de volume nul

(donc  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega) = X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$ )  $\Leftrightarrow$  pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , on a

$$F(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$$

$\Leftrightarrow$  pour tous  $a_i \leq b_i$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{a_i \leq X_i \leq b_i\}\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(a_i \leq X_i \leq b_i).$$

**Sur l'indépendance** :

- Si  $(X_1, \dots, X_n)(\Omega)$  n'est pas un ensemble produit, alors  $X_1, \dots, X_n$  ne sont pas (mutuellement) indépendantes.
- $X_1, \dots, X_n$  sont indépendantes  $\Rightarrow$  pour toutes fonctions  $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ , les var  $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$  sont indépendantes.
- $X_1, \dots, X_n$  sont indépendantes  $\Rightarrow$  pour toutes fonctions  $g : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}$  et  $h : \mathbb{R}^{n-(q+1)} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $q \in \{2, \dots, n-1\}$ , les var  $g(X_1, \dots, X_q)$  et  $h(X_{q+1}, \dots, X_n)$  sont indépendantes.

**Formule du transfert** : Pour toute fonction  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , on a

$$\mathbb{E}(g(X_1, \dots, X_n)) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, \dots, x_n) f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

**Espérance et indépendance** :  $X_1, \dots, X_n$  sont indépendantes  $\Rightarrow$  pour toute fonction  $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ , on a

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n g_i(X_i)\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(g_i(X_i)).$$

Covariance :

$$\mathbb{C}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Matrice de covariance :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathbb{C}(X_1, X_1) & \mathbb{C}(X_1, X_2) & \dots & \dots & \mathbb{C}(X_1, X_n) \\ \mathbb{C}(X_2, X_1) & \mathbb{C}(X_2, X_2) & \dots & \dots & \mathbb{C}(X_2, X_n) \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \mathbb{C}(X_{n-1}, X_n) \\ \mathbb{C}(X_n, X_1) & \dots & \dots & \dots & \mathbb{C}(X_n, X_n) \end{pmatrix}.$$

Espérance et variance d'une somme de  $n$  var :

$$\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i), \quad \mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) + 2 \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} \mathbb{C}(X_i, X_j).$$

$X_1, \dots, X_n$  sont indépendantes  $\Rightarrow \mathbb{C}(X_i, X_j) = 0$  pour tout  $i \neq j$  avec  $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2 \Rightarrow$

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i).$$

Bilinéarité de la covariance :

$$\mathbb{C}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^q b_j Y_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^q a_i b_j \mathbb{C}(X_i, Y_j).$$

**Théorème du changement de variable (pour un couple de var, i.e.  $n = 2$ ) :** Soient  $(X, Y)$  un couple de var de densité  $f_{(X,Y)}$ , et  $\phi : (X, Y)(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\psi : (X, Y)(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions.

On considère le couple de var :

$$(U, V) = (\phi(X, Y), \psi(X, Y)).$$

On suppose que  $g(x, y) = (\phi(x, y), \psi(x, y))$  est injective et qu'il existe deux fonctions  $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow X(\Omega)$  et  $k : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y(\Omega)$  différentiables telles que

$$\begin{cases} u = \phi(x, y), \\ v = \psi(x, y), \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = h(u, v), \\ y = k(u, v). \end{cases}$$

Soit  $J(u, v)$  le jacobien associé à  $(x, y) = (h(u, v), k(u, v))$  défini par le déterminant :

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial h}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial h}{\partial v}(u, v) \\ \frac{\partial k}{\partial u}(u, v) & \frac{\partial k}{\partial v}(u, v) \end{vmatrix} = \frac{\partial h}{\partial u}(u, v) \frac{\partial k}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial k}{\partial u}(u, v) \frac{\partial h}{\partial v}(u, v).$$

Alors une densité de  $(U, V)$  est donnée par

$$f_{(U,V)}(u, v) = f_{(X,Y)}(h(u, v), k(u, v)) |J(u, v)|, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$



## 2 Loi normale

### 2.1 Généralités

#### Densité

On dit qu'une *var*  $X$  suit la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , avec  $\mu \in \mathbb{R}$  et  $\sigma > 0$ , si elle possède la densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(On adopte désormais la notation :  $X \sim \dots \Leftrightarrow X$  suit la loi  $\dots$ ).

Le résultat suivant est alors central :

La fonction  $f$  définie précédemment est bien une densité.

#### Preuve :

- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $f(x) \geq 0$ .
- En faisant le changement de variable :  $x = \sigma y + \mu$ , en écrivant l'intégrale simple obtenue comme une intégrale double, puis en faisant un changement de variable en coordonnées polaires :


$(y, z) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ ,  $r \geq 0$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$  (de jacobien  $r$ ), il vient

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} \sigma dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right) \left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2+z^2}{2}} dy dz} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)}{2}} r dr d\theta} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\left( \int_0^{2\pi} d\theta \right) \left( \int_0^{\infty} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{[ \theta ]_0^{2\pi} \left[ -e^{-\frac{r^2}{2}} \right]_0^{\infty}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi \times 1} = 1. \end{aligned}$$

□

## Représentation graphique

Des densités associées à la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , avec plusieurs valeurs de  $\mu$  et  $\sigma$ , sont représentées ci-dessous :



De manière générale, le graphe de la densité  $f$  est symétrique par rapport à  $\mu$ . Celui-ci est en forme de "cloche" plus ou moins arrondie selon les valeurs de  $\sigma$ .

En outre, ce graphe a

- un point maximum de coordonnées :  $(x_*, y_*) = (\mu, f(\mu)) = \left(\mu, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)$ ,
- deux points d'inflexion de coordonnées

$$(x_0, y_0) = \left(\mu - \sigma, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{1}{2}}\right), \quad (x_1, y_1) = \left(\mu + \sigma, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{1}{2}}\right).$$

## Paramètres

Soit  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Alors on a

$$\mathbb{E}(X) = \mu, \quad \mathbb{V}(X) = \sigma^2, \quad \sigma(X) = \sigma.$$

## Preuve :

- On a  $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X - \mu) + \mu$ , avec

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X - \mu) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[ -\sigma^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} = 0. \end{aligned}$$

D'où

$$\mathbb{E}(X) = 0 + \mu = \mu.$$

- En utilisant l'égalité :  $\mathbb{E}(X) = \mu$ , en faisant une intégration par parties et en utilisant l'égalité :  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ , il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}((X - \mu)^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left( \left[ (x - \mu) \times \left( -\sigma^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \left( -\sigma^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left( 0 + \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \right) = \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \sigma^2 \times 1 = \sigma^2. \end{aligned}$$

- On a

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \sqrt{\sigma^2} = \sigma.$$

□



## Transformée de Laplace

Soit  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Alors la transformée de Laplace de  $X$  est

$$L(t) = e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Preuve :** En faisant le changement de variable :  $x = \sigma y + \mu$ , et en utilisant l'égalité :

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\alpha)^2}{2}} dy = 1$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$  (car c'est l'intégrale d'une densité associée à la loi normale  $\mathcal{N}(\alpha, 1)$ ), pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , il vient

$$\begin{aligned} L(t) &= \mathbb{E}(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{t(\sigma y + \mu)} e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} \sigma dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{t\mu} \int_{-\infty}^{\infty} e^{t\sigma y} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{t\mu} e^{\frac{t^2\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(y-t\sigma)^2}{2}} dy = e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-t\sigma)^2}{2}} dy = e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}} \times 1 \\ &= e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}. \end{aligned}$$

□

Remarque : On a  $L'(t) = (\mu + t\sigma^2)e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}$  et  $L''(t) = (\sigma^2 + (\mu + t\sigma^2)^2)e^{t\mu + \frac{t^2\sigma^2}{2}}$ .

On retrouve alors l'espérance et la variance de  $X$  :

$$\mathbb{E}(X) = L'(0) = \mu, \quad \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = L''(0) - (L'(0))^2 = \sigma^2 + \mu^2 - \mu^2 = \sigma^2.$$

## Combinaison linéaire

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $a_0, a_1, \dots, a_n$   $n+1$  réels et  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec

$X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . On pose

$$Y_n = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i X_i.$$

Alors on a

$$Y_n \sim \mathcal{N}\left(a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right).$$

**Preuve :** Étudions la transformée de Laplace de  $Y_n$ . Par l'indépendance de  $X_1, \dots, X_n$  et l'égalité :

$L_{X_i}(t) = \mathbb{E}(e^{tX_i}) = e^{t\mu_i + \frac{t^2\sigma_i^2}{2}}$ ,  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , il vient

$$\begin{aligned} L_{Y_n}(t) &= \mathbb{E}(e^{tY_n}) = \mathbb{E}\left(e^{t\left(a_0 + \sum_{i=1}^n a_i X_i\right)}\right) = e^{ta_0} \mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n e^{ta_i X_i}\right) = e^{ta_0} \prod_{i=1}^n \mathbb{E}\left(e^{ta_i X_i}\right) \\ &= e^{ta_0} \prod_{i=1}^n L_{X_i}(ta_i) = e^{ta_0} \prod_{i=1}^n e^{ta_i \mu_i + \frac{t^2 a_i^2 \sigma_i^2}{2}} = e^{t\left(a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \mu_i\right) + \frac{t^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2}{2}}. \end{aligned}$$

On reconnaît la transformée de Laplace associée à la loi  $\mathcal{N}\left(a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$ . Comme la transformée de Laplace d'une *var* caractérise sa loi, on a

$$Y_n \sim \mathcal{N}\left(a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right).$$

□

**Applications :**

- Soit  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , on a  $X + a \sim \mathcal{N}(\mu + a, \sigma^2)$ . C'est une application du résultat précédent avec  $n = 1$ ,  $a_0 = a$ ,  $a_1 = 0$  et  $X_1 = X$ .
- Soit  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Pour tout  $b \in \mathbb{R}^*$ , on a  $bX \sim \mathcal{N}(b\mu, b^2\sigma^2)$ . C'est une application du résultat précédent avec  $n = 1$ ,  $a_0 = 0$ ,  $a_1 = b$  et  $X_1 = X$ .
- Soit  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Alors on a

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

C'est une application du résultat précédent avec  $n = 1$ ,  $a_0 = -\frac{\mu}{\sigma}$ ,  $a_1 = \frac{1}{\sigma}$  et  $X_1 = X$ . Ainsi, la transformation opérée par  $Z$  a centrée et réduite la *var*  $X$ .

- Soient  $X_1, \dots, X_n$  *n var iid* suivant chacune la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Alors on a

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

C'est une application du résultat précédent avec  $a_0 = 0$ , et  $a_i = \frac{1}{n}$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

On a également

$$\sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right) \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

C'est un résultat est à la base des intervalles de confiance et des tests statistiques.

## 2.2 Complément : sur la loi normale centrée réduite

### Densité

On dit qu'une *var*  $X$  suit la loi normale centrée réduite  $\mathcal{N}(0, 1)$  si elle possède la densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a  $\mathbb{E}(X) = 0$ , d'où le "centrée", et  $\mathbb{V}(X) = 1$ , d'où le "réduite".

Comme  $f$  est paire,  $X$  est symétrique. Cela implique :

- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $\mathbb{P}(-X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ ,
- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $\mathbb{P}(X \leq -x) = 1 - \mathbb{P}(X \leq x)$ ,
- pour tout  $x \geq 0$ , on a  $\mathbb{P}(|X| \leq x) = 2\mathbb{P}(X \leq x) - 1$ ,
- pour toute fonction impaire  $g$ , si existence, on a  $\mathbb{E}(g(X)) = 0$ .

### Moments

Soit  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on a

$$\mathbb{E}(X^{2k}) = \prod_{i=1}^k (2i - 1), \quad \mathbb{E}(X^{2k+1}) = 0.$$

On peut dresser le tableau des moments suivant :

$r$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\mathbb{E}(X^r)$	0	1 ↗×	0 ↘=	3 ↗×	0 ↘=	15 ↗×	0 ↘=	105 ↗×	945 ↘=

Les flèches précisent que les moments non nuls peuvent se calculer simplement avec un produit croisé.

## Table de valeurs et loi normale centrée réduite

Soit  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . La fonction de la répartition de  $X$  est

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On a  $F(x) = F(y) \Leftrightarrow x = y$ , et  $f(x) = F'(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . La fonction  $F$  ne peut pas s'écrire sous une forme analytique. On utilise alors une table de valeurs donnant  $F(x)$  avec  $x \in [0, 3.99]$  et  $x = x_1 + x_2$  :

$x_1 \backslash x_2$	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000



### 3 Loi du Chi-deux

#### Densité

On dit qu'une var  $X$  suit la loi du Chi-deux  $\chi^2(\nu)$ , avec  $\nu > 0$ , si elle possède la densité :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où  $\Gamma$  désigne la fonction gamma d'Euler définie par :  $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ ,  $x > 0$

(cette fonction vérifie, entre autre, pour tout  $m \in \mathbb{N}^*$  :  $\Gamma(x+m) = \Gamma(x) \prod_{i=0}^{m-1} (x+i)$ ).

Le réel  $\nu$  est appelé degré de liberté.

On peut remarquer que la loi du Chi-deux  $\chi^2(2)$  coïncide avec la loi exponentielle  $\mathcal{E}\left(\frac{1}{2}\right)$  ;

elles possèdent la densité :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le résultat suivant est alors central :

La fonction  $f$  définie précédemment est bien une densité.

#### Preuve :


- Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $f(x) \geq 0$ .
- En faisant le changement de variable :  $x = 2y$ , et en utilisant la définition de  $\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)$ , il vient

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_0^{\infty} \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} (2y)^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{2y}{2}} 2dy \\ &= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} y^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-y} dy = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) = 1. \end{aligned}$$

□

## Représentation graphique

Des densités associées à la loi du Chi-deux  $\chi^2(\nu)$ , avec plusieurs valeurs de  $\nu$ , sont représentées ci-dessous :



## Paramètres

Soit  $X \sim \chi^2(\nu)$ . Alors on a

$$\mathbb{E}(X) = \nu, \quad \mathbb{V}(X) = 2\nu, \quad \sigma(X) = \sqrt{2\nu}.$$

## Preuve :

- En faisant le changement de variable :  $x = 2y$ , et en utilisant l'égalité :  $\Gamma\left(\frac{\nu}{2} + 1\right) = \frac{\nu}{2}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)$ , il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} (2y)^{\frac{\nu}{2}} e^{-\frac{2y}{2}} 2 dy \\ &= 2 \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} y^{\frac{\nu}{2}} e^{-y} dy = 2 \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \Gamma\left(\frac{\nu}{2} + 1\right) = 2 \times \frac{\nu}{2} = \nu. \end{aligned}$$

- On a  $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ . Comme  $\mathbb{E}(X) = \nu$ , il reste à calculer  $\mathbb{E}(X^2)$ . En faisant le changement de variable :  $x = 2y$ , et en utilisant l'égalité :  $\Gamma\left(\frac{\nu}{2} + 2\right) = \left(\frac{\nu}{2} + 1\right) \frac{\nu}{2} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)$ , il vient

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} (2y)^{\frac{\nu}{2}+1} e^{-\frac{2y}{2}} 2 dy \\ &= 4 \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} y^{\frac{\nu}{2}+1} e^{-y} dy = 4 \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \Gamma\left(\frac{\nu}{2} + 2\right) = 4 \left(\frac{\nu}{2} + 1\right) \frac{\nu}{2} = (\nu + 2)\nu.\end{aligned}$$

Il s'ensuit

$$\mathbb{V}(X) = (\nu + 2)\nu - (\nu)^2 = 2\nu.$$

- On a

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \sqrt{2\nu}.$$

□

### Transformée de Laplace

Soit  $X \sim \chi^2(\nu)$ . Alors la transformée de Laplace de  $X$  est

$$L(t) = \frac{1}{(1 - 2t)^{\frac{\nu}{2}}}, \quad t \in \left] -\infty, \frac{1}{2} \right[.$$

**Preuve :** En faisant le changement de variable :  $y = (1 - 2t)x$ , et en utilisant l'égalité :  $\int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = 1$ , pour tout  $t \in \left] -\infty, \frac{1}{2} \right[$ , on obtient

$$\begin{aligned}L(t) &= \mathbb{E}(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx = \int_0^{\infty} e^{tx} \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{(1-2t)x}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} \left(\frac{y}{1-2t}\right)^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} \frac{1}{1-2t} dy = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\nu}{2}}} \int_0^{\infty} \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} y^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} dy \\ &= \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\nu}{2}}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\nu}{2}}} \times 1 = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\nu}{2}}}.\end{aligned}$$

□

Remarque : On a

$$L'(t) = \frac{\nu}{(1-2t)^{\frac{\nu}{2}+1}} \quad L''(t) = \frac{\nu(\nu+2)}{(1-2t)^{\frac{\nu}{2}+2}}.$$



On retrouve alors l'espérance et la variance de  $X$  :

$$\mathbb{E}(X) = L'(0) = \nu, \quad \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = L''(0) - (L'(0))^2 = \nu(\nu + 2) - \nu^2 = 2\nu.$$

### Liaison avec la loi normale

Soit  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Alors on a  $X^2 \sim \chi^2(1)$ .

**Preuve :** Étudions la transformée de Laplace de  $X^2$ . En faisant le changement de variable :  $y = x\sqrt{1-2t}$ , et en utilisant l'égalité :  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 1$  (car c'est l'intégrale d'une densité associée à la loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ ), pour tout  $t \in ]-\infty, \frac{1}{2}[$ , on obtient

$$\begin{aligned} L_{X^2}(t) &= \mathbb{E}(e^{tX^2}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx^2} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(1-2t)x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-2t}} dy = \frac{1}{\sqrt{1-2t}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-2t}} \times 1 = \frac{1}{\sqrt{1-2t}}. \end{aligned}$$

On reconnaît la transformée de Laplace associée à la loi  $\chi^2(1)$ . Comme la transformée de Laplace d'une *var* caractérise sa loi, on a  $X^2 \sim \chi^2(1)$ .

□

### Somme

Soit  $X$  et  $Y$  deux *var* indépendantes avec  $X \sim \chi^2(\alpha)$  et  $Y \sim \chi^2(\beta)$ . Alors on a

$$X + Y \sim \chi^2(\alpha + \beta).$$

**Preuve :** Étudions la transformée de Laplace de  $X + Y$ . Par l'indépendance de  $X$  et  $Y$ , et les égalités :  $L_X(t) = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\alpha}{2}}}$  et  $L_Y(t) = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\beta}{2}}}$ ,  $t \in ]-\infty, \frac{1}{2}[$ , pour tout  $t \in ]-\infty, \frac{1}{2}[$ , il vient

$$\begin{aligned} L_{X+Y}(t) &= \mathbb{E}(e^{t(X+Y)}) = \mathbb{E}(e^{tX} e^{tY}) = \mathbb{E}(e^{tX}) \mathbb{E}(e^{tY}) = L_X(t) L_Y(t) \\ &= \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\alpha}{2}}} \times \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\beta}{2}}} = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{\alpha+\beta}{2}}}. \end{aligned}$$

On reconnaît la transformée de Laplace associée à la loi  $\chi^2(\alpha + \beta)$ . Comme la transformée de Laplace d'une *var* caractérise sa loi, on a  $X + Y \sim \chi^2(\alpha + \beta)$ .

□

Applications :

- Soient  $X$  et  $Y$  deux *var iid* suivant chacune la loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

$$X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2).$$

C'est une application du résultat précédent en remarquant que  $X^2$  et  $Y^2$  sont indépendantes avec  $X^2 \sim \chi^2(1)$  et  $Y^2 \sim \chi^2(1)$ .

- Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  *var iid* suivant chacune la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . Alors on a

$$K_n = \sum_{i=1}^n \left( \frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n).$$

C'est une application du résultat précédent utilisant un raisonnement par récurrence et le fait que, comme  $\frac{X_1 - \mu}{\sigma}, \dots, \frac{X_n - \mu}{\sigma}$  sont *iid* suivant chacune la loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ ,  $\left( \frac{X_1 - \mu}{\sigma} \right)^2, \dots, \left( \frac{X_n - \mu}{\sigma} \right)^2$  sont également *iid* suivant chacune la loi du Chi-deux  $\chi^2(1)$ .



## 4 Loi de Student

### Densité


On dit qu'une *var*  $X$  suit la loi de Student  $\mathcal{T}(\nu)$ , avec  $\nu > 0$ , si elle possède la densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Le réel  $\nu$  est appelé degré de liberté.

### Représentation graphique

Des densités associées à la loi de Student  $\mathcal{T}(\nu)$ , avec plusieurs valeurs de  $\nu$ , sont représentées ci-dessous :



## Caractérisation

Soient  $X$  et  $Y$  deux *var* indépendantes avec  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et  $Y \sim \chi^2(\nu)$ . Alors on a

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{\nu}}} \sim \mathcal{T}(\nu).$$

**Preuve :**

- Dans un premier temps, déterminons une densité du couple  $(T, Y)$ . On a  $(T, Y) = \left(\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{\nu}}}, Y\right)$  et  $(u, v) = \left(\frac{x}{\sqrt{\frac{y}{\nu}}}, y\right) \Leftrightarrow (x, y) = (u\sqrt{\frac{v}{\nu}}, v)$ . Le théorème du changement de variable nous assure qu'une densité de  $(T, Y)$  est donnée par

$$f_{(T,Y)}(u, v) = f_{(X,Y)}\left(u\sqrt{\frac{v}{\nu}}, v\right) |J(u, v)|, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

où  $f_{(X,Y)}$  est une densité de  $(X, Y)$  et  $J(u, v)$  est le jacobien associé à  $(x, y) = (u\sqrt{\frac{v}{\nu}}, v)$ .

Comme  $(X, Y)(\Omega) = \mathbb{R} \times [0, \infty[$ , on a  $(T, Y)(\Omega) = \mathbb{R} \times [0, \infty[$ . Par conséquent, pour tout

$(u, v) \notin \mathbb{R} \times [0, \infty[$ , on a  $f_{(T,Y)}(u, v) = 0$ . Pour tout  $(u, v) \in \mathbb{R} \times [0, \infty[$ , en utilisant l'indépendance de  $X$  et  $Y$ , *i.e.*  $f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ , et

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u} \left(u\sqrt{\frac{v}{\nu}}\right) & \frac{\partial}{\partial v} \left(u\sqrt{\frac{v}{\nu}}\right) \\ \frac{\partial}{\partial u} v & \frac{\partial}{\partial v} v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sqrt{\frac{v}{\nu}} & \frac{u}{2\sqrt{\nu v}} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \sqrt{\frac{v}{\nu}},$$

il vient

$$\begin{aligned} f_{(T,Y)}(u, v) &= f_X\left(u\sqrt{\frac{v}{\nu}}\right) f_Y(v) \sqrt{\frac{v}{\nu}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(u\sqrt{\frac{v}{\nu}})^2}{2}} \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} v^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}} \sqrt{\frac{v}{\nu}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu} 2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} v^{\frac{(\nu+1)}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}\left(1+\frac{u^2}{\nu}\right)}. \end{aligned}$$

Au final, une densité de  $(T, Y)$  est

$$f_{(T,Y)}(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu} 2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} v^{\frac{(\nu+1)}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}\left(1+\frac{u^2}{\nu}\right)} & \text{si } (u, v) \in \mathbb{R} \times [0, \infty[, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Une densité de  $T$  est donnée par :  $f_T(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(T,Y)}(u,v)dv$ ,  $u \in \mathbb{R}$ . On a  $T(\Omega) = \mathbb{R}$ . En faisant le changement de variable :  $y = \frac{v}{2} \left(1 + \frac{u^2}{v}\right)$ , pour tout  $u \in \mathbb{R}$ , on a

$$\begin{aligned} f_T(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{(T,Y)}(u,v)dv = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu} 2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} v^{\frac{(\nu+1)}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}\left(1+\frac{u^2}{v}\right)} dv \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu} 2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} v^{\frac{(\nu+1)}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}\left(1+\frac{u^2}{v}\right)} dv \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu} 2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} \left(\frac{2y}{1+\frac{u^2}{v}}\right)^{\frac{(\nu+1)}{2}-1} e^{-y} \frac{2}{1+\frac{u^2}{v}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{u^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \int_0^{\infty} y^{\frac{(\nu+1)}{2}-1} e^{-y} dy = \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{u^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right). \end{aligned}$$

Ainsi, une densité de  $T$  est

$$f_T(u) = \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{u^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad u \in \mathbb{R}.$$

□

Remarque : Le résultat précédent prouve que  $f$  est bien une densité.

### Paramètres

Soit  $X \sim \mathcal{T}(\nu)$ .

- Si  $\nu \leq 1$ , l'espérance de  $X$  n'existe pas, sinon on a

$$\mathbb{E}(X) = 0.$$

- Si  $\nu \leq 2$ , la variance de  $X$  n'existe pas, sinon on a

$$\mathbb{V}(X) = \frac{\nu}{\nu-2}, \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{\nu}{\nu-2}}.$$

### Preuve :

- Comme  $X$  possède une densité  $f$  paire,  $X$  est symétrique; quand elle existe, son espérance est nulle :  $\mathbb{E}(X) = 0$ .
- On a  $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ . Comme  $\mathbb{E}(X) = 0$ , il reste à calculer  $\mathbb{E}(X^2)$ .

Le plus rapide est d'utiliser la caractérisation de la loi de Student démontrée précédemment :  $X$  suit la même loi que  $\frac{A}{\sqrt{\frac{B}{\nu}}}$ , avec  $A$  et  $B$  deux *var* indépendantes,  $A \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et  $B \sim \chi^2(\nu)$ . Comme  $A$  et  $B$  sont indépendantes, il en est de même pour  $A^2$  et  $\frac{1}{B}$ , ce qui entraîne

$$\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}\left(\left(\frac{A}{\sqrt{\frac{B}{\nu}}}\right)^2\right) = \nu \mathbb{E}\left(\frac{A^2}{B}\right) = \nu \mathbb{E}(A^2) \mathbb{E}\left(\frac{1}{B}\right).$$

Comme  $A \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , on a  $\mathbb{E}(A^2) = \mathbb{V}(A) + (\mathbb{E}(A))^2 = 1 + 0^2 = 1$ . D'autre part, comme  $B \sim \chi^2(\nu)$ , en faisant le changement de variable :  $x = 2y$  et en utilisant l'égalité :  $\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) = \left(\frac{\nu}{2} - 1\right) \Gamma\left(\frac{\nu}{2} - 1\right)$ , il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{1}{B}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} f_B(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \times \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} x^{\frac{\nu}{2}-2} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} (2y)^{\frac{\nu}{2}-2} e^{-y} 2 dy \\ &= \frac{1}{2 \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_0^{\infty} y^{\frac{\nu}{2}-2} e^{-y} dy = \frac{1}{2 \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \Gamma\left(\frac{\nu}{2} - 1\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\frac{\nu}{2} - 1} = \frac{1}{\nu - 2}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{E}(X^2) = \nu \times 1 \times \frac{1}{\nu - 2} = \frac{\nu}{\nu - 2}.$$

Il s'ensuit

$$\mathbb{V}(X) = \frac{\nu}{\nu - 2} - 0^2 = \frac{\nu}{\nu - 2}.$$

o On a

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \sqrt{\frac{\nu}{\nu - 2}}.$$

□

## Approximation

Lorsque  $\nu \geq 31$ , on peut approcher la loi de Student  $\mathcal{T}(\nu)$  par la loi normale  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

**Éléments de preuve :** Cette approximation, tournée vers pratique, repose sur le lemme de Scheffé et la convergence :

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

□

## 5 Loi de Fisher

### Densité


On dit qu'une *var*  $X$  suit la loi de Fisher  $\mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ , avec  $\nu_1 > 0$  et  $\nu_2 > 0$ , si elle possède la densité :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} x^{\frac{\nu_1}{2}} \left(\frac{\nu_1 x}{\nu_1 x + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} \left(1 - \frac{\nu_1 x}{\nu_1 x + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_2}{2}} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les réels  $\nu_1$  et  $\nu_2$  sont appelés degrés de liberté.

### Représentation graphique

Des densités associées à la loi de Fisher  $\mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ , avec plusieurs valeurs de  $\nu_1$  et  $\nu_2$ , sont représentées ci-dessous :





## Caractérisation

Soient  $X$  et  $Y$  deux *var* indépendantes avec  $X \sim \chi^2(\nu_1)$  et  $Y \sim \chi^2(\nu_2)$ . Alors on a

$$F = \frac{X}{Y} \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2).$$

### Preuve :

- Dans un premier temps, déterminons une densité du couple  $(F, Y)$ . On a  $(F, Y) = \left(\frac{X}{Y}, Y\right)$  et  $(u, v) = \left(\frac{x}{y}, y\right) \Leftrightarrow (x, y) = \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}uv, v\right)$ . Le théorème du changement de variable nous assure qu'une densité de  $(F, Y)$  est donnée par

$$f_{(F,Y)}(u, v) = f_{(X,Y)}\left(\frac{\nu_1}{\nu_2}uv, v\right) |J(u, v)|, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

où  $f_{(X,Y)}$  est une densité de  $(X, Y)$  et  $J(u, v)$  est le jacobien associé à  $(x, y) = \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}uv, v\right)$ .

Comme  $(X, Y)(\Omega) = [0, \infty[^2$ , on a  $(F, Y)(\Omega) = [0, \infty[^2$ . Par conséquent, pour tout  $(u, v) \notin [0, \infty[^2$ , on a  $f_{(F,Y)}(u, v) = 0$ . Pour tout  $(u, v) \in \mathbb{R} \times ]0, \infty[$ , en utilisant l'indépendance de  $X$  et  $Y$ , *i.e.*

$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ , et

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}uv\right) & \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}uv\right) \\ \frac{\partial}{\partial u} v & \frac{\partial}{\partial v} v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\nu_1}{\nu_2}v & \frac{\nu_1}{\nu_2}u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\nu_1}{\nu_2}v,$$

il vient

$$\begin{aligned} f_{(F,Y)}(u, v) &= f_X\left(\frac{\nu_1}{\nu_2}uv\right) f_Y(v) \left|\frac{\nu_1}{\nu_2}v\right| \\ &= \frac{1}{2^{\frac{\nu_1}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}uv\right)^{\frac{\nu_1}{2}-1} e^{-\frac{\nu_1}{\nu_2}uv} \frac{1}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} v^{\frac{\nu_2}{2}-1} e^{-\frac{\nu_2}{2}v} \\ &= \frac{1}{2^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} u^{\frac{\nu_1}{2}-1} v^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}-1} e^{-\frac{\nu_2}{2}\left(1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u\right)}. \end{aligned}$$

Au final, une densité de  $(F, Y)$  est

$$f_{(F,Y)}(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} u^{\frac{\nu_1}{2}-1} v^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}-1} e^{-\frac{\nu_2}{2}\left(1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u\right)} & \text{si } (u, v) \in [0, \infty[^2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Une densité de  $F$  est donnée par :  $f_F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{(F,Y)}(u,v)dv$ ,  $u \in \mathbb{R}$ . On a  $F(\Omega) = [0, \infty[$ . En faisant le changement de variable :  $y = \frac{v}{2} \left(1 + \frac{\nu_1}{\nu_2} u\right)$ , pour tout  $u \in [0, \infty[$ , on a

$$\begin{aligned}
f_F(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{(F,Y)}(u,v)dv = \int_0^{\infty} \frac{1}{2^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} u^{\frac{\nu_1}{2}-1} v^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}\left(1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u\right)} dv \\
&= \frac{1}{2^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} u^{\frac{\nu_1}{2}-1} \int_0^{\infty} v^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}-1} e^{-\frac{v}{2}\left(1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u\right)} dv \\
&= \frac{1}{2^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} u^{\frac{\nu_1}{2}-1} \int_0^{\infty} \left(\frac{2y}{1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u}\right)^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}-1} e^{-y} \frac{2}{1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u} dy \\
&= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} u^{\frac{\nu_1}{2}-1} \left(1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u\right)^{-\frac{\nu_1+\nu_2}{2}} \int_0^{\infty} y^{\frac{\nu_1+\nu_2}{2}-1} e^{-y} dy \\
&= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} u^{\frac{\nu_1}{2}-1} \left(1+\frac{\nu_1}{\nu_2}u\right)^{-\frac{\nu_1+\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right) \\
&= \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} u \left(\frac{\nu_1 u}{\nu_1 u + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} \left(1 - \frac{\nu_1 u}{\nu_1 u + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_2}{2}}.
\end{aligned}$$

Ainsi, une densité de  $F$  est

$$f_F(u) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} u \left(\frac{\nu_1 u}{\nu_1 u + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} \left(1 - \frac{\nu_1 u}{\nu_1 u + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_2}{2}} & \text{si } u \geq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

□

Remarque : Le résultat précédent prouve que  $f$  est bien une densité.

Applications :

- Si  $X \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ , alors on a  $\frac{1}{X} \sim \mathcal{F}(\nu_2, \nu_1)$ .

C'est une application du résultat précédent : si  $X \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ , alors  $X$  suit la même loi que  $\frac{A}{\frac{B}{\nu_2}}$ , avec  $A$  et  $B$  deux *var* indépendantes,  $A \sim \chi^2(\nu_1)$  et  $B \sim \chi^2(\nu_2)$ . Donc  $\frac{1}{X} = X^{-1}$  suit la même loi que  $\left(\frac{A}{\frac{B}{\nu_2}}\right)^{-1} = \frac{B}{\frac{A}{\nu_1}}$ , laquelle suit la loi de Fisher  $\mathcal{F}(\nu_2, \nu_1)$ .

- Si  $X \sim \mathcal{T}(\nu)$ , alors on a  $X^2 \sim \mathcal{F}(1, \nu)$ . C'est une application du résultat précédent : si  $X \sim \mathcal{T}(\nu)$ , alors  $X$  suit la même loi que  $\frac{A}{\sqrt{\frac{B}{\nu}}}$ , avec  $A$  et  $B$  deux *var* indépendantes,  $A \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et  $B \sim \chi^2(\nu)$ .

Donc  $X^2$  suit la même loi que  $\frac{A^2}{\frac{B}{\nu}} = \frac{A^2}{\frac{B}{\nu}}$ , laquelle suit la loi de Fisher  $\mathcal{F}(1, \nu)$  car  $A^2$  et  $B$  sont indépendantes,  $A^2 \sim \chi^2(1)$  et  $B \sim \chi^2(\nu)$ .

## Paramètres

Soit  $X \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$ .

- Si  $\nu_2 < 3$ , l'espérance de  $X$  n'existe pas, sinon on a

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2}.$$

- Si  $\nu_2 < 4$ , la variance de  $X$  n'existe pas, sinon on a

$$\mathbb{V}(X) = \frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)}, \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)}}.$$

## Preuve :

- Le plus rapide est d'utiliser la caractérisation de la loi de Fisher démontrée précédemment :  $X$  suit la même loi que  $\frac{\frac{A}{\nu_1}}{\frac{B}{\nu_2}}$ , avec  $A$  et  $B$  deux *var* indépendantes,  $A \sim \chi^2(\nu_1)$  et  $B \sim \chi^2(\nu_2)$ . Comme  $A$  et  $B$  sont indépendantes, il en est de même pour  $A$  et  $\frac{1}{B}$ , ce qui entraîne

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\left(\frac{\frac{A}{\nu_1}}{\frac{B}{\nu_2}}\right) = \frac{\nu_2}{\nu_1} \mathbb{E}\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{\nu_2}{\nu_1} \mathbb{E}(A) \mathbb{E}\left(\frac{1}{B}\right).$$

Comme  $A \sim \chi^2(\nu_1)$ , on a  $\mathbb{E}(A) = \nu_1$ . D'autre part, comme  $B \sim \chi^2(\nu_2)$ , en faisant le changement de variable :  $x = 2y$  et en utilisant l'égalité :  $\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right) = \left(\frac{\nu_2}{2} - 1\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2} - 1\right)$ , il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{1}{B}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} f_B(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \times \frac{1}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} x^{\frac{\nu_2}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \int_0^{\infty} x^{\frac{\nu_2}{2}-2} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \int_0^{\infty} (2y)^{\frac{\nu_2}{2}-2} e^{-y} 2dy \\ &= \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \int_0^{\infty} y^{\frac{\nu_2}{2}-2} e^{-y} dy = \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2} - 1\right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\frac{\nu_2}{2} - 1} = \frac{1}{\nu_2 - 2}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\nu_2}{\nu_1} \times \nu_1 \times \frac{1}{\nu_2 - 2} = \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2}.$$

- On a  $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ . Comme  $\mathbb{E}(X) = \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2}$ , il reste à calculer  $\mathbb{E}(X^2)$ . Nous allons utiliser de nouveau la caractérisation de la loi de Student :  $X$  suit la même loi que  $\frac{\frac{A}{\nu_1}}{\frac{B}{\nu_2}}$ , avec  $A$  et  $B$  deux *var* indépendantes,  $A \sim \chi^2(\nu_1)$  et  $B \sim \chi^2(\nu_2)$ .

Comme  $A$  et  $B$  sont indépendantes, il en est de même pour  $A^2$  et  $\frac{1}{B^2}$ , ce qui entraîne

$$\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}\left(\left(\frac{A}{B}\right)^2\right) = \frac{\nu_2^2}{\nu_1^2} \mathbb{E}\left(\frac{A^2}{B^2}\right) = \frac{\nu_2^2}{\nu_1^2} \mathbb{E}(A^2) \mathbb{E}\left(\frac{1}{B^2}\right).$$

Comme  $A \sim \chi^2(\nu_1)$ , on a

$$\mathbb{E}(A^2) = \mathbb{V}(A) + (\mathbb{E}(A))^2 = 2\nu_1 + (\nu_1)^2 = \nu_1(\nu_1 + 2).$$

D'autre part, comme  $B \sim \chi^2(\nu_2)$ , en faisant le changement de variable :  $x = 2y$  et en utilisant l'égalité :

$\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right) = \left(\frac{\nu_2}{2} - 1\right) \left(\frac{\nu_2}{2} - 2\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2} - 2\right)$ , il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(\frac{1}{B^2}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2} f_B(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} x^{\frac{\nu_2}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \int_0^{\infty} x^{\frac{\nu_2}{2}-3} e^{-\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \int_0^{\infty} (2y)^{\frac{\nu_2}{2}-3} e^{-y} 2dy \\ &= \frac{1}{2^2 \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \int_0^{\infty} y^{\frac{\nu_2}{2}-3} e^{-y} dy = \frac{1}{2^2 \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2} - 2\right) = \frac{1}{2^2} \times \frac{1}{\left(\frac{\nu_2}{2} - 1\right) \left(\frac{\nu_2}{2} - 2\right)} \\ &= \frac{1}{(\nu_2 - 2)(\nu_2 - 4)}. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{\nu_2^2}{\nu_1^2} \times \nu_1(\nu_1 + 2) \times \frac{1}{(\nu_2 - 2)(\nu_2 - 4)} = \frac{\nu_2^2(\nu_1 + 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)(\nu_2 - 4)}.$$

Au final, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \frac{\nu_2^2(\nu_1 + 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)(\nu_2 - 4)} - \left(\frac{\nu_2}{\nu_2 - 2}\right)^2 = \frac{\nu_2^2(\nu_1 + 2)(\nu_1 - 2) - \nu_2^2 \nu_1(\nu_2 - 4)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)} \\ &= \frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)}. \end{aligned}$$

○ Il vient

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \sqrt{\frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)}}.$$

□



## 6 Loi du Chi-deux non centrée


### Densité

On dit qu'une *var*  $X$  suit la loi du Chi-deux non centrée  $\chi^2(n, \delta)$ , avec  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\delta > 0$ , si elle possède la densité :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{\delta}{2}} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!} \left(\frac{\delta}{2}\right)^r \frac{1}{2^{\frac{n}{2}+r} \Gamma\left(\frac{n}{2} + r\right)} x^{\frac{n}{2}+r-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

### Représentation graphique

Des densités associées à la loi du Chi-deux non centrée  $\chi^2(n, \delta)$ , avec  $n = 3$  et plusieurs valeurs de  $\delta$ , sont représentées ci-dessous :



### Caractérisation

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, 1)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . On pose  $\delta = \sum_{i=1}^n \mu_i^2$ . Alors on a

$$K_n = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n, \delta).$$

### Paramètres

Soit  $X \sim \chi^2(n, \delta)$ . Alors on a

$$\mathbb{E}(X) = n + \delta, \quad \mathbb{V}(X) = 2(n + 2\delta), \quad \sigma(X) = \sqrt{2(n + 2\delta)}.$$

### Preuve :

- Le plus rapide est d'utiliser la caractérisation de loi du Chi-deux non centrée présentée précédemment :  $X$  suit la même loi que  $\sum_{i=1}^n A_i^2$ , avec  $A_1, \dots, A_n$  indépendantes et  $A_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, 1)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . En utilisant l'égalité :  $\mathbb{E}(A_i^2) = \mathbb{V}(A_i) + (\mathbb{E}(A_i))^2 = 1 + \mu_i^2$ , il vient

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n A_i^2\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(A_i^2) = \sum_{i=1}^n (1 + \mu_i^2) = n + \sum_{i=1}^n \mu_i^2 = n + \delta.$$

- Nous allons utiliser de nouveau la caractérisation de la loi du Chi-deux non centrée :  $X$  suit la même loi que  $\sum_{i=1}^n A_i^2$ , avec  $A_1, \dots, A_n$  indépendantes et  $A_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, 1)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Ainsi, l'indépendance des var  $A_1, \dots, A_n$  entraîne

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n A_i^2\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(A_i^2).$$

D'autre part, pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ , comme  $A_i - \mu_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , on a  $\mathbb{E}((A_i - \mu_i)^4) = 3$ ,  $\mathbb{E}((A_i - \mu_i)^3) = 0$ ,  $\mathbb{E}((A_i - \mu_i)^2) = 1$  et  $\mathbb{E}(A_i - \mu_i) = 0$ . Il s'ensuit :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(A_i^2) &= \mathbb{E}((A_i^2 - \mathbb{E}(A_i^2))^2) = \mathbb{E}((A_i^2 - (1 + \mu_i^2))^2) = \mathbb{E}(((A_i - \mu_i + \mu_i)^2 - 1 - \mu_i^2)^2) \\ &= \mathbb{E}(((A_i - \mu_i)^2 + 2\mu_i(A_i - \mu_i) - 1)^2) = \mathbb{E}((A_i - \mu_i)^4) + 2\mu_i\mathbb{E}((A_i - \mu_i)^3) - \mathbb{E}((A_i - \mu_i)^2) \\ &+ 2\mu_i\mathbb{E}((A_i - \mu_i)^3) + 4\mu_i^2\mathbb{E}((A_i - \mu_i)^2) - 2\mu_i\mathbb{E}(A_i - \mu_i) - \mathbb{E}((A_i - \mu_i)^2) - 2\mu_i\mathbb{E}(A_i - \mu_i) + 1 \\ &= 3 - 1 + 4\mu_i^2 - 1 + 1 = 2 + 4\mu_i^2 = 2(1 + 2\mu_i^2). \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n A_i^2\right) = \sum_{i=1}^n 2(1 + 2\mu_i^2) = 2\left(n + 2\sum_{i=1}^n \mu_i^2\right) = 2(n + 2\delta).$$

○ Il vient

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \sqrt{2(n + 2\delta)}.$$

□

### Transformée de Laplace

Soit  $X \sim \chi^2(n, \delta)$ . La transformée de Laplace de  $X$  est

$$L(t) = \frac{1}{(1 - 2t)^{\frac{n}{2}}} e^{\frac{t\delta}{1-2t}}, \quad t \in \left]-\infty, \frac{1}{2}\right[.$$

**Preuve :** Nous allons utiliser la caractérisation de loi du Chi-deux non centrée présentée précédemment :  $X$  suit la même loi que  $\sum_{i=1}^n A_i^2$ , avec  $A_1, \dots, A_n$  indépendantes et  $A_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, 1)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . On a

$$L(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \mathbb{E}\left(e^{t\sum_{i=1}^n A_i^2}\right) = \mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n e^{tA_i^2}\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(e^{tA_i^2}).$$

Pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ , en notant  $f_{A_i}$  une densité de  $A_i$ , et en utilisant l'égalité :  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta^2}} e^{-\frac{(x-\alpha)^2}{2\beta^2}} dx = 1$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\beta > 0$  (car c'est l'intégrale d'une densité associée à la loi normale  $\mathcal{N}(\alpha, \beta^2)$ ), on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{tA_i^2}) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx^2} f_{A_i}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_i)^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(1-2t)x^2 - 2\mu_i x + \mu_i^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\mu_i^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(1-2t)\frac{1}{2}(x^2 - 2\frac{\mu_i}{1-2t}x)} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\mu_i^2}{2}} e^{\frac{1}{2}\frac{\mu_i^2}{1-2t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(1-2t)\frac{1}{2}(x - \frac{\mu_i}{1-2t})^2} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-2t}} e^{\frac{t\mu_i^2}{1-2t}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\left(\frac{1}{1-2t}\right)}} e^{-\frac{(x - \frac{\mu_i}{1-2t})^2}{2\left(\frac{1}{1-2t}\right)}} dx = \frac{1}{\sqrt{1-2t}} e^{\frac{t\mu_i^2}{1-2t}} \times 1 = \frac{1}{\sqrt{1-2t}} e^{\frac{t\mu_i^2}{1-2t}}. \end{aligned}$$

Il s'ensuit :

$$L(t) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1-2t}} e^{\frac{t\mu_i^2}{1-2t}} = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{n}{2}}} e^{\sum_{i=1}^n \frac{t\mu_i^2}{1-2t}} = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{n}{2}}} e^{\frac{t\delta}{1-2t}}.$$

□



Remarque : En fait, c'est grâce à la caractérisation de la loi du Chi-deux non centrée et l'expression de sa transformée de Laplace que l'on peut expliciter une densité associée.

### Complément : loi de Fisher non centrée


La loi de Fisher non centrée, notée  $\mathcal{F}(n_1, n_2, \delta)$ ,  $n_1 \in \mathbb{N}^*$  et  $n_2 \in \mathbb{N}^*$  et  $\delta > 0$ , est caractérisée par le résultat suivant.

Soient  $X$  et  $Y$  deux *var* indépendantes avec  $X \sim \chi^2(n_1, \delta)$  et  $Y \sim \chi^2(n_2)$ . Alors on a

$$F = \frac{\frac{X}{n_1}}{\frac{Y}{n_2}} \sim \mathcal{F}(n_1, n_2, \delta).$$

On est alors en mesure d'explicitier une densité associée et les paramètres de cette loi.

Des densités associées à la loi de Fisher non centrée  $\mathcal{F}(n_1, n_2, \delta)$ , avec  $(\nu_1, \nu_2) = (3, 2)$  et plusieurs valeurs de  $\delta$ , sont représentées ci-dessous :



## 7 Forme quadratique aléatoire

### Définition

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes et  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ . On appelle forme quadratique en  $X$  toute var  $Q$  telle qu'il existe une matrice carré symétrique  $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2}$  vérifiant

$$Q = X^t A X = \sum_{i=1}^n a_{i,i} X_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} X_i X_j = \sum_{i=1}^n a_{i,i} X_i^2 + 2 \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} X_i X_j.$$

### Résultats en loi

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$  et  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ . Soit  $A$  une matrice carré symétrique  $A$  de dimension  $n \times n$  telle que  $A^2 = A$ .

On pose  $Q = X^t A X$ ,  $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$ ,  $\delta = \frac{1}{\sigma^2} \mu^t A \mu$  et  $d = \text{rang}(A)$ . Alors on a

$$\frac{Q}{\sigma^2} \sim \chi^2(d, \delta).$$

**Commentaire :** La preuve utilise des propriétés d'indépendance de la loi normale multidimensionnelle.

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . On pose :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Alors on a

$$\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2 \sim \chi^2(n-1).$$

**Preuve :** Nous cherchons à appliquer le résultat précédent. En posant  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ , après décomposition, on

peut écrire :

$$(n-1)S_n^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{2}{n} \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} X_i X_j = X^t A X,$$

où  $A$  est la matrice symétrique de dimension  $n \times n$  définie par

$$A = \mathbb{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & \dots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & 1 - \frac{1}{n} & \dots & \dots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \dots & \dots & \dots & 1 - \frac{1}{n} \end{pmatrix}.$$

Comme  $\mathbf{1}_{n \times n} \mathbf{1}_{n \times n} = n \mathbf{1}_{n \times n}$ , on a

$$A^2 = \left( \mathbb{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_{n \times n} \right) \left( \mathbb{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_{n \times n} \right) = \mathbb{I}_n - \frac{2}{n} \mathbf{1}_{n \times n} + \frac{1}{n^2} \mathbf{1}_{n \times n} \mathbf{1}_{n \times n} = \mathbb{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_{n \times n} = A.$$

En posant  $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$ , la somme des valeurs des éléments de chaque colonne de  $A$  étant nulle, on obtient

$\delta = \frac{1}{\sigma^2} \mu^t A \mu = 0$ . De plus, comme  $A^2 = A$ , on a  $d = \text{rang}(A) = \text{trace}(A) = n \left(1 - \frac{1}{n}\right) = n - 1$ . Le résultat précédent implique :

$$\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2 \sim \chi^2(n-1, 0) = \chi^2(n-1).$$

□

### Résultats sur l'indépendance

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$  et

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}.$$

Soient  $A$  et  $B$  deux matrices carrés symétriques  $A$  et  $B$  de dimension  $n \times n$  telles que  $A^2 = A$ ,  $B^2 = B$  et  $AB = BA = 0_{n \times n}$ . Alors les var  $Q_1 = X^t A X$  et  $Q_2 = X^t B X$  sont indépendantes.

**Commentaire :** La preuve utilise des propriétés d'indépendance de la loi normale multidimensionnelle.

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . On pose :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Alors les var  $\bar{X}_n$  et  $S_n$  sont indépendantes.

**Preuve :** Nous cherchons à appliquer le résultat précédent pour montrer que  $n\bar{X}_n^2$  et  $(n-1)S_n^2$  sont indépendances. On pose  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ . On peut alors écrire :

$$n\bar{X}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 + \frac{2}{n} \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} X_i X_j,$$

donc  $n\bar{X}_n^2 = X^t A X$  avec  $A = \frac{1}{n} \mathbb{1}_{n \times n}$ .

De même, on peut écrire :

$$(n-1)S_n^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{2}{n} \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} X_i X_j,$$

donc  $(n-1)S_n^2 = X^t B X$  avec  $B = \mathbb{I}_n - \frac{1}{n} \mathbb{1}_{n \times n}$ .

Comme  $\mathbb{1}_{n \times n} \mathbb{1}_{n \times n} = n \mathbb{1}_{n \times n}$ , on vérifie que  $A^2 = A$ ,  $B^2 = B$  et  $AB = BA = 0_{n \times n}$ . Le résultat précédent implique l'indépendance de  $n\bar{X}_n^2$  et  $(n-1)S_n^2$ , entraînant ainsi l'indépendance de  $\bar{X}_n$  et  $S_n$ .

□

### Var et lois usuelles en Statistique

S'il fallait ne retenir qu'une seule chose de ce document, cela serait le résultat suivant :

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var iid suivant chacune la loi normale  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ . On pose

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Le tableau ci-dessous résume les var usuelles et les lois associées couramment utilisées en Statistique :

var	$\sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right)$	$\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2$	$\sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n} \right)$
Loi	$\mathcal{N}(0, 1)$	$\chi^2(n-1)$	$\mathcal{T}(n-1)$

**Preuve :** Les deux premiers résultats ont déjà été prouvé, il reste à montrer le dernier. On peut écrire :

$$T_n = \sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n} \right) = \frac{Z_n}{\sqrt{\frac{K_n}{n-1}}},$$

avec  $Z_n = \sqrt{n} \left( \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right) \sim \mathcal{N}(0, 1)$  et  $K_n = (n-1) \frac{S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ . Comme  $\bar{X}_n$  et  $S_n$  sont indépendantes, il en de même pour  $Z_n$  et  $K_n$ . Cela caractérise la loi de Student :

$$T_n \sim \mathcal{T}(n-1).$$

□

## 8 Complément : loi normale multidimensionnelle

### Densité

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(X_1, \dots, X_n)$  un vecteur de  $n$  var. On dit que  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$  (vecteur de var colonne pour simplifier les écritures à venir) suit la loi normale multidimensionnelle  $\mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$ , avec  $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  et  $\Sigma$  une matrice symétrique définie positive de dimension  $n \times n$  vérifiant  $\det(\Sigma) > 0$ , s'il possède la densité :

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^t \Sigma^{-1} (x-\mu)}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

On dit alors que  $X$  est un vecteur gaussien de dimension  $n$ .

Notons que, si  $X \sim \mathcal{N}_n(0_n, \mathbb{I}_n)$ , donc  $\mu = 0_n$  et  $\Sigma = \mathbb{I}_n$ , alors on a


$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2}x^t x} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2} = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_i^2}{2}}.$$

Cette forme multiplicative entraîne que :

- $X_1, \dots, X_n$  sont indépendantes,
- $X_1, \dots, X_n$  suivent la même loi avec  $X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ .

**Représentation graphique**

Une densité associée à la loi  $\mathcal{N}_2(0_2, \Sigma)$ , avec  $\Sigma = \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ 1 & 0.5 \end{pmatrix}$  est présentée ci-dessous :

**Densité associée à la loi normale bidimensionnelle**

**Notations**

Soient  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ ,  $Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$  et  $Z = \begin{pmatrix} Z_{1,1} & Z_{2,1} & \dots & Z_{q,1} \\ Z_{1,2} & Z_{2,2} & \dots & Z_{q,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Z_{1,p} & Z_{2,p} & \dots & Z_{q,p} \end{pmatrix}$  des matrices de *var.*

On adopte les notations :

- Espérance de  $X$  :

$$\mathbb{E}_n(X) = \begin{pmatrix} \mathbb{E}(X_1) \\ \vdots \\ \mathbb{E}(X_n) \end{pmatrix}.$$

- Espérance de  $Z$  :

$$\mathbb{E}_{p,q}(Z) = \begin{pmatrix} \mathbb{E}(Z_{1,1}) & \mathbb{E}(Z_{2,1}) & \dots & \mathbb{E}(Z_{q,1}) \\ \mathbb{E}(Z_{1,2}) & \mathbb{E}(Z_{2,2}) & \dots & \mathbb{E}(Z_{q,2}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbb{E}(Z_{1,p}) & \mathbb{E}(Z_{2,p}) & \dots & \mathbb{E}(Z_{q,p}) \end{pmatrix}.$$

- Covariance de  $X$  et  $Y$  :

$$\mathbb{C}_n(X, Y) = \mathbb{E}_{n,n}((X - \mathbb{E}_n(X))(Y - \mathbb{E}_n(Y))^t) = \begin{pmatrix} \mathbb{C}(X_1, Y_1) & \mathbb{C}(X_1, Y_2) & \dots & \mathbb{C}(X_1, Y_n) \\ \mathbb{C}(X_2, Y_1) & \mathbb{C}(X_2, Y_2) & \dots & \mathbb{C}(X_2, Y_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbb{C}(X_n, Y_1) & \mathbb{C}(X_n, Y_2) & \dots & \mathbb{C}(X_n, Y_n) \end{pmatrix}.$$

- Matrice de covariance de  $X$  :

$$\mathbb{V}_n(X) = \mathbb{C}_n(X, X) = \mathbb{E}_{n,n}((X - \mathbb{E}_n(X))(X - \mathbb{E}_n(X))^t).$$

**Paramètres**

Soit  $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$ . Alors on a

$$\mathbb{E}_n(X) = \mu, \quad \mathbb{V}_n(X) = \Sigma.$$



**Forme linéaire**

Soit  $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$ .

- Soient  $A$  une matrice de dimension  $p \times n$  avec  $p \leq n$  et  $a \in \mathbb{R}^n$  un vecteur colonne. Alors on a

$$AX + a \sim \mathcal{N}_n(A\mu + a, A\Sigma A^t)$$

(donc  $\mathbb{E}_n(AX + a) = A\mu + a$  et  $\mathbb{V}_n(AX + a) = A\Sigma A^t$ ).

- Soient  $A$  une matrice de dimension  $p \times n$  avec  $p \leq n$  et  $B$  une matrice de dimension  $q \times n$  avec  $q \leq n$ . Alors on a

$$\mathbb{C}_n(AX, BX) = A\Sigma B^t.$$

**Vecteurs gaussiens et indépendance**

Soit  $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$ . Soient  $A$  une matrice de dimension  $p \times n$  avec  $p$  un entier inférieur à  $n$  et  $B$  une matrice de dimension  $q \times n$  avec  $q$  un entier inférieur à  $n$ . Alors  $AX$  et  $BX$  sont indépendantes si et seulement si  $A\Sigma B^t = 0_{p \times q}$ .

Ainsi, les composantes de tout sous vecteur de  $X$  sont indépendantes si et seulement si leurs covariances sont nulles.

**Retour sur deux résultats**

En utilisant certaines propriétés des vecteurs gaussiens, nous allons donner des éléments de preuves à deux résultats présentés dans la section précédente.

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$  et

$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ . Soit  $A$  une matrice carré symétrique  $A$  de dimension  $n \times n$  telle que  $A^2 = A$ .

On pose  $Q = X^t A X$ ,  $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$ ,  $\delta = \frac{1}{\sigma^2} \mu^t A \mu$  et  $d = \text{rang}(A)$ . Alors on a

$$\frac{Q}{\sigma^2} \sim \chi^2(d, \delta).$$

**Preuve :** Comme  $A^2 = A$ , par diagonalisation de  $A$ , il existe une matrice  $P$  de dimension  $n \times d$  vérifiant :  $A = PP^t$  et  $P^tP = \mathbb{I}_d$ . De plus, par hypothèse, on a  $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \sigma^2 \mathbb{I}_n)$ . On en déduit que

$$\frac{P^t X}{\sigma} \sim \mathcal{N}_d\left(\frac{P^t \mu}{\sigma}, \Sigma\right),$$

avec  $\Sigma = \frac{1}{\sigma^2} P^t \sigma^2 \mathbb{I}_n P = P^t P = \mathbb{I}_d$ . Par conséquent, en posant  $Y_i = \frac{[P^t X]_i}{\sigma}$ , la  $i$ -ème composante du vecteur  $\frac{P^t X}{\sigma}$  pour tout  $i \in \{1, \dots, d\}$ , alors  $Y_1, \dots, Y_n$  sont indépendantes avec  $Y_i \sim \mathcal{N}\left(\frac{[P^t \mu]_i}{\sigma}, 1\right)$  et

$$\frac{Q}{\sigma^2} = \frac{X^t A X}{\sigma^2} = \frac{X^t P P^t X}{\sigma^2} = \left(\frac{P^t X}{\sigma}\right)^t \left(\frac{P^t X}{\sigma}\right) = \sum_{i=1}^d Y_i^2.$$

La caractérisation de la loi du Chi-deux non centrée nous assure que

$$\frac{Q}{\sigma^2} \sim \chi^2(d, \delta),$$

avec

$$\delta = \sum_{i=1}^n \left(\frac{[P^t \mu]_i}{\sigma}\right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} (P^t \mu)^t (P^t \mu) = \frac{1}{\sigma^2} \mu^t P P^t \mu = \frac{1}{\sigma^2} \mu^t A \mu.$$

□

Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  var indépendantes avec  $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$  et  $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ . Soient  $A$  et  $B$  deux matrices carrés symétriques  $A$  et  $B$  de dimension  $n \times n$  telles que  $A^2 = A$ ,  $B^2 = B$  et  $AB = BA = 0_{n \times n}$ . Alors les var  $Q_1 = X^t A X$  et  $Q_2 = X^t B X$  sont indépendantes.

**Preuve :** On pose  $p = \text{rang}(A)$  et  $q = \text{rang}(B)$ . Comme  $A^2 = A$ , par diagonalisation de  $A$ , il existe une matrice  $P$  de dimension  $n \times p$  vérifiant  $A = PP^t$  et  $P^tP = \mathbb{I}_p$ . De même, comme  $B^2 = B$ , il existe une matrice  $Q$  de dimension  $n \times q$  vérifiant  $B = QQ^t$  et  $Q^tQ = \mathbb{I}_q$ . Remarquons que

$$Q_1 = X^t A X = X^t P P^t X = (P^t X)^t P^t X, \quad Q_2 = X^t B X = X^t Q Q^t X = (Q^t X)^t Q^t X.$$

Ainsi,  $Q_1$  est fonction de  $P^t X$  et  $Q_2$  est fonction de  $Q^t X$ . Pour conclure à l'indépendance de  $Q_1$  et  $Q_2$ , il suffit de montrer que  $P^t X$  et  $Q^t X$  sont indépendantes.

Comme  $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \sigma^2 \mathbb{I}_n)$ , avec  $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}$ , on a  $P^t X$  et  $Q^t X$  indépendantes si et seulement si

$$P^t \sigma^2 \mathbb{I}_n Q = 0_{p \times q} \Leftrightarrow P^t Q = 0_{p \times q}.$$


La condition  $AB = 0_{n \times n}$  entraîne :

$$PP^t QQ^t = 0_{n \times n} \Rightarrow P^t PP^t QQ^t Q = P^t 0_{n \times n} Q = 0_{p \times q} \Rightarrow \mathbb{I}_p P^t Q \mathbb{I}_q = 0_{p \times q} \Rightarrow P^t Q = 0_{p \times q}.$$

On en déduit que  $P^t X$  et  $Q^t X$  sont indépendantes, entraînant ainsi l'indépendance de  $Q_1$  et  $Q_2$ .

□

## 9 Annexe : reproduction des graphiques

Les graphiques de ce document ont été obtenus avec le logiciel  :

<https://cran.r-project.org/>

Cette section propose les commandes R permettant leur reproduction.

### Loi normale

```
curve(dnorm(x, 0, 1), xlim = c(-10, 10), ylim = c(0, 0.58), col = "red", lwd = 3,
ylab = "", main = "Densités associées à la loi normale")
curve(dnorm(x, 2, 3), col = "green", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dnorm(x, 0, 5), col = "blue", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dnorm(x, -2, 0.7), col = "yellow", lwd = 3, add = TRUE)
abline(h = 0, lty = 2)
abline(v = 0, lty = 2)
legend("topright",
legend = c(
expression(paste(mu, "=0, ", sigma, "=1")),
expression(paste(mu, "=2, ", sigma, "=3")),
expression(paste(mu, "=0, ", sigma, "=5")),
expression(paste(mu, "=-2, ", sigma, "=0.7"))),
lwd = 3, col = c("red", "green", "blue", "yellow"))
```

### Loi du Chi-deux

```
curve(dchisq(x, 1), xlim = c(0, 10), ylim = c(0, 0.58), col = "red", lwd = 3,
ylab = "", main = "Densités associées à la loi du Chi-deux")
curve(dchisq(x, 2), col = "green", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dchisq(x, 4), col = "blue", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dchisq(x, 6), col = "yellow", lwd = 3, add = TRUE)
abline(h = 0, lty = 2)
abline(v = 0, lty = 2)
legend("topright",
legend = c(
expression(paste(nu, "=1")),
expression(paste(nu, "=2")),
expression(paste(nu, "=4")),
expression(paste(nu, "=6"))),
lwd = 3, col = c("red", "green", "blue", "yellow"))
```

### Loi de Student

```
curve(dt(x, 1), xlim = c(-6, 6), ylim = c(0, 0.38), col = "red", lwd = 3,
ylab = "", main = "Densités associées à la loi de Student")
curve(dt(x, 2), col = "green", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dt(x, 5), col = "blue", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dt(x, 16), col = "yellow", lwd = 3, add = TRUE)
abline(h = 0, lty = 2)
abline(v = 0, lty = 2)
legend("topright",
legend = c(
expression(paste(nu, "=1")),
expression(paste(nu, "=2")),
expression(paste(nu, "=5")),
expression(paste(nu, "=16"))),
lwd = 3, col = c("red", "green", "blue", "yellow"))
```

### Loi de Fisher

```
curve(df(x, 1, 1), xlim = c(0, 3), ylim = c(0, 1), col = "red", lwd = 3,
ylab = "", main = "Densités associées à la loi de Fisher")
curve(df(x, 3, 1), col = "green", lwd = 3, add = TRUE)
curve(df(x, 1, 3), col = "blue", lwd = 3, add = TRUE)
curve(df(x, 5, 5), col = "yellow", lwd = 3, add = TRUE)
curve(df(x, 7, 15), col = "orange", lwd = 3, add = TRUE)
abline(h = 0, lty = 2)
abline(v = 0, lty = 2)
legend("topright",
legend = c(
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (1, 1)")),
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (3, 1)")),
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (1, 3)")),
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (5, 5)")),
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (7, 15)"))),
lwd = 3, col = c("red", "green", "blue", "yellow", "orange"))
```

### Loi du Chi-deux non centrée

```
curve(dchisq(x, 3, 1), xlim = c(0, 16), ylim = c(0, 0.21), col = "red", lwd = 3,
ylab = "", main = "Densités associées à la loi du Chi-deux non centrée")
curve(dchisq(x, 3, 2), col = "green", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dchisq(x, 3, 4), col = "blue", lwd = 3, add = TRUE)
curve(dchisq(x, 3, 7), col = "yellow", lwd = 3, add = TRUE)
abline(h = 0, lty = 2)
abline(v = 0, lty = 2)
legend("topright",
legend = c(
expression(paste(n, "=3, ", delta, "=1")),
expression(paste(n, "=3, ", delta, "=2")),
expression(paste(n, "=3, ", delta, "=4")),
expression(paste(n, "=3, ", delta, "=7"))),
lwd = 3, col = c("red", "green", "blue", "yellow"))
```

### Loi de Fisher non centrée

```
curve(df(x, 3, 2, 1), xlim = c(0, 8), ylim = c(0, 0.5), col = "red", lwd = 3,
ylab = "", main = "Densités associées à la loi de Fisher non centrée")
curve(df(x, 3, 2, 2), col = "green", lwd = 3, add = TRUE)
curve(df(x, 3, 2, 4), col = "blue", lwd = 3, add = TRUE)
curve(df(x, 3, 2, 10), col = "yellow", lwd = 3, add = TRUE)
abline(h = 0, lty = 2)
abline(v = 0, lty = 2)
legend("topright",
legend = c(
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (3, 2), " , delta, "=1")),
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (3, 2), " , delta, "=2")),
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (3, 2), " , delta, "=4")),
expression(paste( "(", nu[1] , ",", nu[2], ") ", " = (3, 2), " , delta, "=10"))),
lwd = 3, col = c("red", "green", "blue", "yellow"))
```

### Loi normale multidimensionnelle

```
library(mvtnorm)
N = 100
Mean = c(0, 0)
Sigma = matrix(c(1, 0.5, 0.5, 1), 2, 2)
x = seq(-3, 3, length = N)
y = seq(-3, 3, length = N)
z = matrix(0, N, N)
for (i in 1:N) for (j in 1:N) {
z[i, j] = dmvnorm(c(x[i], y[j]), Mean, Sigma)
}
persp(x, y, z, main = "Densité associée à la loi normale bidimensionnelle",
col= topo.colors(10))
```